L'USAGE DU TABAC CHEZ LES CANADIENS EN 1981

Par W.J. Millar

Direction de la promotion de la santé
Direction générale des services et de la promotion de la santé
Santé et Bien-être social Canada

Nous tenons à remercier de leur précieux concours Mike Sheridan, Scott Buchanan et June Lavergne, du Groupe des enquêtes spéciales ainsi que Don Royce, de la Division des méthodes de recensement et d'enquêtes-ménages de Statistique Canada.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1983

N° de cat. H 39-66/1983F

ISBN 0-662-92064-3

Also available in English under the title, «Smoking Behaviour of Canadians 1981»

10-4508

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Sommaire	1
Introduction	3
Prévalence du tabagisme	4
Tendances, 1966-1981	4
Différences régionales	4
L'habitude de fumer chez les adolescents	6
Niveau d'instruction	7
Profession	8
Exposition aux risques que le tabac fait courir à la santé	9
Nombre de cigarettes fumées par jour	9
Teneur en goudron des marques de consommation courante	11
Durée de l'habitude de la cigarette	12
Efforts de renoncement au tabac	14
Efforts manifestes pour réduire le taux de consommation de tabac	15
Abandon du tabac	16
Ex-fumeurs réguliers	17
Les non-fumeurs	18
Consommation intérieure de produits du tabac	20
Conclusions	22
Tableaux et graphiques	23
Appendices	75
Méthodologie	75
Dérivation de la variable "effort manifeste pour réduire la taux de consommation tabagique"	77
Enquête sur les habitudes de fumer 1981	78

LISTE DES TABLEAUX

PRÉVALENCE DU TABAGISME

		Page
Tableau 1	Pourcentage de la population de 15 ans et plus, par type d'usage du tabac, sexe et groupe d'âge, Canada, 1981.	23
Tableau 2	Nombre et pourcentage estimatifs de fumeurs réguliers de cigarettes dans la population de 15 ans et plus, par sexe et groupe d'âge, Canada, 1981.	24
Tableau 3	Pourcentage de fumeurs réguliers de cigarettes chez les hommes de 15 ans et plus, par région et par groupe d'âge, Canada, de 1966 à 1981.	25
Tableau 4	Pourcentage de fumeuses régulières de cigarettes chez les femmes de 15 ans et plus, par région et par groupe d'âge, Canada, de 1966 à 1981.	26
Tableau 5	Répartition estimative par âge et par sexe de la population de 15 ans et plus, selon la province, Canada, 1981.	27
Tableau 6	Nombre de fumeurs réguliers de cigarettes chez les 15 ans et plus, par sexe, groupe d'âge et province, Canada, 1981.	28
Tableau 7	Pourcentage de fumeurs réguliers de cigarettes chez les 15 ans et plus, par sexe, groupe d'âge et province, Canada, 1981.	29
Tableau 8	Relation entre l'usage du tabac et le degré d'instruction, Canada, 1981.	30
Tableau 9	Nombre de fumeurs réguliers chez les 15 ans et plus, selon le sexe, la région géographique et le niveau d'instruction, Canada, 1981.	31
Tableau 10	Pourcentage de fumeurs réguliers chez les 15 ans et plus, selon le sexe, la région géographique et le niveau d'instruction, Canada, 1981.	32
Tableau 11	Répartition estimative de la population de 15 ans et plus, selon le sexe, le groupe d'âge et le niveau d'instruction, Canada, 1981.	33
Tableau 12	Nombre de fumeurs réguliers dans la population de 15 ans et plus, selon le sexe, le groupe d'âge et le niveau d'instruction, Canada, 1981.	34

Page

Tableau 13 Pourcentage de fumeurs réguliers de cigarettes dans la population de 15 ans et plus, selon le sexe, le groupe d'âge et le niveau d'instruction, Canada, 1981. 35

Tableau 14 Chiffres de population et nombre de fumeurs réguliers de cigarettes dans la population de 15 ans et plus, selon le sexe, le groupe d'âge et la région, Canada, 1981. 36

Tableau 15 Pourcentage de fumeurs réguliers de cigarettes dans la population de 15 ans et plus, selon le sexe, le groupe d'âge et la région, Canada, 1981. 37

Tableau 16 Pourcentage de fumeurs réguliers dans la population de 15 ans et plus, selon le sexe et la catégorie d'occupation, Canada, 1981. 38

TABLEAUX FAISANT ÉTAT DE L'EXPOSITION AUX RISQUES

Tableau 17 Répartition en pourcentage des fumeurs réguliers de cigarettes dans la population de 15 ans et plus, d'après le nombre de cigarettes fumées par jour, Canada, 1981. 39

Tableau 18 Répartition en pourcentage des fumeurs réguliers de cigarettes dans la population de 15 ans et plus, selon le sexe et selon la quantité de cigarettes fumées par jour, Canada, 1970 et 1981. 40

Tableau 19 Chiffres de population et nombre de fumeurs réguliers de cigarettes dans la population de 15 ans et plus, selon le sexe, la région géographique et la quantité de cigarettes fumées par jour, Canada, 1981. 41

Tableau 20 Répartition proportionnelle estimative des fumeurs réguliers de cigarettes de 15 ans et plus, selon le sexe, la région géographique et la quantité de cigarettes fumées par jour, Canada, 1981. 42

Tableau 21 Répartition proportionnelle des fumeurs réguliers de cigarettes des deux sexes, selon la quantité de cigarettes fumées par jour, le groupe d'âge et la région géographique, Canada, 1981. 43

Tableau 22 Répartition proportionnelle des fumeurs réguliers de cigarettes chez les femmes, selon la quantité de cigarettes fumées par jour, le groupe d'âge et la région géographique, Canada, 1981. 44

Page

Tableau 23 Répartition proportionnelle des fumeurs réguliers de cigarettes chez les hommes, selon la quantité de cigarettes fumées par jour, le groupe d'âge et la région géographique, Canada, 1981. 45

Tableau 24 Répartition proportionnelle des fumeurs réguliers de cigarettes chez les 15 ans et plus, selon le sexe, la quantité de cigarettes fumées par jour et le niveau d'instruction, Canada, 1981. 46

Tableau 25 Répartition proportionnelle des fumeurs réguliers de cigarettes selon la teneur en goudron de la marque que l'on fume couramment, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1981. 47

Tableau 26 Répartition proportionnelle des fumeurs réguliers de cigarettes âgés de 15 ans et plus des deux sexes, selon la teneur en goudron de la marque que l'on fume couramment et la région, Canada, 1981. 48

Tableau 27 Répartition proportionnelle des fumeurs réguliers de cigarettes âgés de 15 ans et plus des deux sexes, selon la teneur en goudron de la marque que l'on fume couramment et le niveau d'instruction, Canada, 1981. 49

Tableau 28 Population des fumeurs réguliers de cigarettes de 15 ans et plus, selon l'âge où l'on a commencé de fumer, l'âge actuel et le sexe, Canada, 1981. 50

Tableau 29 Répartition proportionnelle des fumeurs réguliers de cigarettes, selon les années d'exposition à l'usage du tabac, la région géographique et le sexe, Canada, 1981. 51

TABLEAUX FAISANT ÉTAT DE LA CESSATION DE L'USAGE DU TABAC

Tableau 30 Nombre estimatif d'habitués de la cigarette ayant tenté de cesser de fumer au cours de la dernière année, selon le sexe, le groupe d'âge et la région, Canada, 1981. 52

Tableau 31 Pourcentage estimatif d'habitués de la cigarette ayant tenté de cesser de fumer au cours de la dernière année, selon le sexe, le groupe d'âge et la région, Canada, 1981. 53

Tableau 32 Nombre estimatif des fumeurs d'habitude ayant tenté de cesser de fumer au cours de la dernière année, selon le sexe, la région et le niveau d'instruction, Canada, 1981. 54

Page

Tableau 33 Pourcentage estimatif des fumeurs d'habitude ayant tenté de cesser de fumer au cours de la dernière année, selon le sexe, la région et le niveau d'instruction, Canada, 1981. 55

Tableau 34 Nombre d'habitués de la cigarette ayant fait un effort manifeste pour réduire leur taux de consommation, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, 1981. 56

Tableau 35 Nombre et pourcentage des fumeurs d'habitude de 15 ans et plus qui ont fait un effort manifeste pour réduire leur taux de consommation, selon la région et le sexe, Canada, 1981. 57

Tableau 36 Fumeurs d'habitude de 15 ans et plus qui ont fait un effort manifeste pour réduire leur taux de consommation, leur nombre étant exprimé en pourcentage par rapport à l'ensemble des fumeurs, selon le sexe et le niveau d'instruction, Canada, 1981. 58

Tableau 37 Taux d'abandon de l'usage du tabac chez les Canadiens qui ont déjà fumé régulièrement, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1981. 59

Tableau 38 Nombre et pourcentage d'anciens fumeurs réguliers de cigarettes chez les 15 ans et plus, selon le sexe et la région, Canada, 1981. 60

Tableau 39 Nombre et pourcentage d'anciens fumeurs réguliers de cigarettes chez les 15 ans et plus, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1981. 61

Tableau 40 Nombre et pourcentage de non-fumeurs de la population de 15 ans et plus, par sexe et groupe d'âge, Canada, 1981. 62

Tableau 41 Pourcentage de non-fumeurs dans la population de 15 ans et plus, par sexe et groupe d'âge, Canada, 1965 à 1981. 63

Tableau 42 Nombre de non-fumeurs dans la population de 15 ans et plus, par sexe, groupe d'âge et région, Canada, 1981. 64

Tableau 43 Pourcentage de non-fumeurs dans la population de 15 ans et plus, par sexe, groupe d'âge et région, Canada, 1981. 65

Tableau 44 Répartition estimative de la population de 15 ans et plus, par sexe, région et niveau d'instruction, Canada, 1981. 66

Page

Tableau 45 Nombre de non-fumeurs dans la population de 15 ans et plus, par sexe, région et niveau d'instruction, Canada, 1981. 67

Tableau 46 Pourcentage de non-fumeurs dans la population de 15 ans et plus, par sexe, région et niveau d'instruction, Canada, 1981. 68

VENTES DE TABAC AU PAYS

Tableau 47 Ventes nationales et consommation par habitant de cigarettes toutes faites et roulées à la main, Canada, 1968-1981. 69

Tableau 48 Consommation quotidienne estimative de cigarettes par fumeur au Canada, 1965-1981. 70

LISTE DES GRAPHIQUES

		Page
Graphique 1	Pourcentage de fumeurs réguliers chez les 15 ans et plus, selon le sexe, Canada, de 1966 à 1981.	71
Graphique 2	Pourcentage de fumeurs réguliers chez les 15 ans et plus, selon l'âge et le sexe, Canada, 1966 et 1981.	72
Graphique 3	Part du marché des marques canadiennes de cigarettes à faible teneur en goudron, de 1973 à 1981.	73
Graphique 4	Moyenne (pondérée selon les ventes) des émissions de goudron en milligrammes par cigarette, des marques canadiennes, de 1968 à 1981.	74
Annexe A	Méthodologie	75
Annexe B	Dérivation de la variable "effort manifeste pour réduire le taux de consommation de tabac".	77
Annexe C	Protocole d'interview - Enquête de 1981 sur les habitudes de fumer.	78

SOMMAIRE

En 1981 la proportion des fumeurs d'habitude dans la population adulte (âgée de 15 ans et plus) atteignait 33 pour cent, soit le plus bas niveau enregistré en 15 ans.

Entre 1966 et 1981, le pourcentage d'hommes adultes qui fumaient régulièrement est tombé de 54 à 36 pour cent. Durant la même période, la prévalence de l'usage du tabac chez les femmes a régressé de 32 à 29 pour cent.

De 1968 à 1981, la consommation de cigarettes par habitant au Canada est demeurée relativement stable en dépit de reculs importants dans la prévalence de l'usage du tabac. En 1968, la consommation atteignait le chiffre de 3703 cigarettes par personne. Elle est passée à 3901 cigarettes par habitant en 1977, pour tomber ensuite à 3872 en 1981.

Tout semble indiquer qu'il y a eu un déclin dans la proportion de fumeurs habituels qui consommaient de une à 10 cigarettes par jour. La proportion des fumeurs dans les groupes à plus forte consommation a augmenté tant chez les hommes que chez les femmes. Entre 1970 et 1981, l'accroissement relatif de la proportion de fumeurs consommant plus de 25 cigarettes par jour a été plus marqué chez les femmes (64 %) que chez les hommes (23,8 %). En 1970, à peu près 10 pour cent des fumeurs d'habitude grillaient plus de 25 cigarettes par jour. Leur proportion est passée à 13 pour cent en 1981.

Ces 15 dernières années, le pourcentage d'adolescents qui fument régulièrement la cigarette a régressé de façon significative. Le taux relatif a diminué de 35 pour cent durant cette période. Le pourcentage d'adolescents qui fumaient régulièrement est passé d'un taux initial de 20 % en 1966 à 28 % en 1972, pour tomber ensuite à 23 % en 1981. Cette année-là, la proportion de fumeurs d'habitude chez les adolescents des deux sexes était à peu près la même (23 %).

Le recul dans la prévalence de l'usage du tabac chez les sujets de sexe masculin a été observé dans toutes les régions et chez tous les groupes d'âge. Les femmes de toutes les régions ont également diminué leur consommation de tabac. On a noté cependant un léger accroissement des taux de prévalence chez les femmes de 20 à 24 ans, au Québec et en Ontario.

De 1968 à 1981, les apports moyens en goudron des cigarettes canadiennes (moyennes pondérées à partir des ventes) ont baissé de 21,1 mg à 13,5 mg. La part du marché des marques canadiennes de cigarettes à faible teneur en goudron, que l'on définit arbitrairement comme les marques ayant des émissions nominales de goudron inférieures ou égales à 12 mg, représentait 8,3 % du marché en 1973 et 34,3 % en 1981.

À peu près 37 pour cent de tous les fumeurs d'habitude ont déclaré avoir fait un effort pour renoncer au tabac durant l'année précédant notre enquête. Cet effort de renoncement avait tendance à se manifester surtout chez les répondants des groupes 15-19 ans et 20-24 ans. Les comparaisons

faites d'une région à l'autre révèlent que la proportion de fumeurs qui ont cherché à s'affranchir de leur habitude est plus élevée au Québec que partout ailleurs. Environ 42 pour cent des Québécois et 46 pour cent des Québécoises ont déclaré avoir fait des efforts en ce sens.

Environ 18 pour cent des fumeurs et 20 pour cent des fumeuses ont modifié leurs habitudes de consommation d'une manière qui laisserait supposer une exposition moindre aux émissions de goudron, durant l'année précédant l'enquête. Les méthodes les plus courantes pour réduire les taux de consommation de tabac consistaient à changer pour une marque de cigarettes à faible teneur en goudron, ou à fumer moins.

L'USAGE DU TABAC CHEZ LES CANADIENS

INTRODUCTION

C'est maintenant un fait reconnu: l'usage du tabac constitue un important facteur de risque pour la santé des Canadiens. Un rapport technique de l'Organisation mondiale de la Santé précise que:

> "les maladies liées à l'usage du tabac constituent dans les pays économiquement avancés des causes si importantes d'incapacité de travail et de décès prématurés que la lutte contre cette habitude pourrait faire beaucoup plus pour améliorer la santé et prolonger la vie dans ces pays que n'importe quel autre programme particulier de médecine préventive".

Depuis 1965, le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social suit l'évolution du tabagisme chez les Canadiens au moyen de suppléments à l'Enquête sur la population active menée par Statistique Canada. La présente publication, rédigée à titre de document de travail pour ceux qui s'intéressent à ce problème, contient des tableaux statistiques et une analyse descriptive des tendances de l'habitude de fumer, l'accent étant mis sur la dernière enquête menée en décembre 1981.

Un certain nombre de modifications ont été apportées à l'Enquête de 1981 sur les habitudes de fumer. Des questions supplémentaires posées aux enquêtés avaient pour but de définir plus nettement les groupes à risque élevé, et de discerner les groupes chez qui la tendance vers une réduction des taux de consommation ou vers la cessation de l'usage du tabac est plus évidente. Les questions d'appoint visent à mesurer la durée d'exposition aux risques du tabac, l'âge où l'on a pris l'habitude de fumer, ainsi que les tentatives de renoncer au tabac ou d'en réduire la consommation. Le questionnaire de l'enquête et la méthode utilisée sont donnés en annexe. Des tableaux statistiques détaillés apparaissent à la fin du rapport. Des estimations de la population de base, établies d'après le classement démographique de la population active, sont fournies afin de faciliter au lecteur la comparaison entre les différents groupes d'âge.

PRÉVALENCE DE L'USAGE DU TABAC AU CANADA EN 1981
(tableaux 1 à 16)

Dans notre rapport, les fumeurs sont classés par catégorie selon les types de fumeurs, et ce à partir de la question: "À l'heure actuelle, le sujet... fume-t-il la cigarette?"

La courbe générale de la prévalence de l'usage du tabac au Canada semble en régression dans tous les groupes d'âge. En décembre 1981, quelque six millions de Canadiens représentant 32,7 % de la population adulte âgée de 15 ans et plus étaient fumeurs d'habitude. Les fumeurs occasionnels représentaient 3,5 % de la population, et les simples adeptes de la pipe ou du cigare 2 %.

En examinant l'usage habituel du tabac en fonction de l'âge et du sexe, on constate que 36,7 % des hommes fument régulièrement, contre 28,9 % des femmes. Les sujets de sexe masculin sont plus susceptibles de fumer que les sujets de sexe féminin, et ce dans tous les groupes d'âge à l'exception de celui des 15-19 ans où la prévalence de l'habitude de fumer est aujourd'hui sensiblement la même pour l'un et l'autre sexe. Toutefois, le recul proportionnel de la prévalence dans le groupe d'âge 15-19 ans, entre les années 1979 et 1981, a été plus prononcé du côté masculin. Les données issues d'autres sondages s'accordent avec l'hypothèse suivant laquelle la prévalence de l'usage du tabac accuse un déclin chez les 15-19 ans. Les estimations concernant la prévalence de l'usage du tabac chez les hommes de 15 à 19 ans ont régressé de 35,1 % en 1966 à 22,8 % en 1981, tandis que les estimations relatives aux femmes ont progressé de 20 % en 1966 à 26 % en 1979, avant de tomber à 23,4 % en 1981.

Tendances de la prévalence de l'usage du tabac au Canada, de 1966 à 1981
(tableaux 3 et 4)

Entre 1966 et 1981, la proportion des fumeurs d'habitude chez les Canadiens de 15 ans et plus a régressé de 42,8% environ à 32,7 %. Les fumeurs masculins représentent la plus grande part du recul total. Durant la même période, la proportion des fumeurs habituels chez les hommes a chuté de 53,6 % à 36,7 %. Ce recul s'est manifesté dans tous les groupes d'âge.

Les niveaux de consommation de tabac chez les femmes ont de tout temps été inférieurs à ceux chez les hommes. Entre 1966 et 1977, la proportion des femmes qui fumaient régulièrement est demeurée relativement stable. En 1979, la prévalence de l'usage du tabac chez les femmes a commencé de régresser pour atteindre 28,9 % en 1981.

Tendances régionales (tableaux 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14 et 15)

Le décalage d'une région à l'autre a toujours constitué un élément essentiel des courbes de consommation de tabac chez les Canadiens. Entre 1966 et 1981, le recul général de la prévalence de l'usage du tabac dans la

population masculine s'est reflété dans les diminutions régionales. Les reculs relatifs les plus importants se sont fait jour au Québec (18,9 %) et en Colombie-Britannique (17,6 %), ces provinces étant suivies par l'Ontario (17,2 %), la région atlantique (14,5 %) et la région des Prairies 12,3 %). En 1981, le Québec et les provinces de l'Atlantique présentaient la plus forte proportion de fumeurs d'habitude masculins au Canada. Pour ce qui est du Québec, la prévalence de la consommation de tabac en 1981 se comparait au niveau atteint par la population masculine de l'Ontario il y a une dizaine d'années. Du point de vue régional, la Colombie-Britannique (30,5 %), l'Ontario (33,1 %) et la région des Prairies (34,2 %) affichaient la plus faible proportion de fumeurs d'habitude chez les hommes.

La courbe de régression en ce qui concerne la population féminine âgée de 15 ans et plus a révélé une variation régionale qui n'est pas sans intérêt. En Colombie-Britannique, dans les Prairies et en Ontario, on a assisté à une lente régression marginale entre 1966 et 1981. À la fin de cette période, chacune des régions précitées présentait un niveau de prévalence inférieur à celui observé en 1966. Dans la région atlantique et au Québec, la prévalence de l'usage du tabac chez les femmes a eu tendance à augmenter au début puis, après 1977, à régresser jusqu'à son niveau de 1966. En 1981, le Québec (33,4 %) et la région atlantique (29 %) comptaient les plus fortes proportions de fumeurs réguliers chez les femmes, alors que la Colombie-Britannique (26,1 %), la région des Prairies (27,1 %) et l'Ontario (27,2 %) avaient les proportions les plus faibles. Cette tendance était semblable à celle observée dans la population masculine.

Les enquêtes antérieures sur la population active nous ont fourni des estimations pour ce qui est de l'analyse de la consommation de tabac à l'échelle nationale et régionale. Sur le plan provincial, il est possible d'obtenir des chiffres fiables en ce qui concerne la prévalence de l'usage du tabac. Toutefois, la variance de l'échantillonnage constitue un facteur limitatif quand il s'agit de produire des tableaux où figurent des données détaillées à double entrée.

Le tableau 7 nous renseigne sur la prévalence de l'usage du tabac dans chaque province. Parmi les provinces de l'Atlantique, l'Île-du-Prince-Édouard est celle qui avait la plus faible proportion de fumeurs habituels. À peu près 30 pour cent des adultes de cette province fumaient régulièrement, contre 34 pour cent à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse, et 35 pour cent au Nouveau-Brunswick.

En termes relatifs, la prévalence de l'usage du tabac chez les hommes de l'Île-du-Prince-Édouard était de 15 pour cent inférieure à celle enregistrée chez les hommes des autres provinces de l'Atlantique. La proportion des fumeuses d'habitude chez les femmes insulaires n'était que légèrement inférieure aux pourcentages observés dans les autres provinces de l'Atlantique.

La prévalence de l'usage du tabac était plus faible en Saskatchewan qu'au Manitoba ou en Alberta. Environ 27 pour cent des adultes y fumaient de façon régulière, comparé à 29 pour cent au Manitoba et à 33 pour cent en Alberta. Les différences en ce qui concerne les habitudes de fumer dans

la région des Prairies étaient, là encore, plus notoires chez les hommes que chez les femmes. Trente pour cent des hommes de la Saskatchewan fumaient régulièrement, comparé à 33 pour cent des hommes du Manitoba et à 37 pour cent de ceux de l'Alberta. En Saskatchewan, 25 % des femmes fumaient régulièrement. La proportion de fumeuses chez les femmes du Manitoba était légèrement plus élevée (26 %). En Alberta, 29 % des femmes fumaient régulièrement.

L'habitude de fumer chez les adolescents (tableaux 4 et 5)

La proportion des fumeurs réguliers chez les adolescents est à la baisse elle aussi, davantage chez les garçons que chez les filles. Le recours aux réponses relayées par des tiers, ou enquêtes-substituts, peut conduire à sous-estimer la consommation de tabac chez les adolescents. Néanmoins cette coutume a toujours caractérisé les enquêtes menées depuis 1966, et il est peu probable que la tendance générale en matière d'usage du tabac soit influencée par les réponses des tiers. De toute façon les données de 1981 feront l'objet d'une analyse plus approfondie, afin de déterminer dans quelle mesure il peut y avoir sous-estimation.

La diminution du pourcentage de fumeurs réguliers dans la population masculine de 15 à 19 ans est un phénomène patent dans toutes les régions. La baisse relative la plus marquée a eu lieu au Québec (15,9 %), suivi de l'Ontario (10,9 %) et la Colombie-Britannique (10,2 %). Des reculs relatifs de moindre importance ont été enregistrés dans les provinces des Prairies et de l'Atlantique.

En ce qui concerne la proportion de fumeurs réguliers dans la population féminine de 15 à 19 ans, les tendances différaient de celles observées chez les adolescents. En 1966, le pourcentage des adolescentes qui fumaient régulièrement était de beaucoup inférieur à celui de leurs pairs masculins. À l'échelle nationale, la prévalence de l'usage du tabac chez les adolescentes s'est nettement accrue entre 1966 et 1972, et l'on a observé une lente régression au cours des enquêtes subséquentes. En 1981, la proportion des adolescentes qui fumaient régulièrement dépassait l'estimation initiale de la prévalence observée en 1966 dans toutes les régions sauf en Colombie-Britannique. En 1981 toujours, la proportion des habituées de la cigarette chez les adolescentes du Québec (32,4 %) correspondait presque au double de celle enregistrée en Colombie-Britannique (16,6 %). Au Québec, en Ontario et dans la région des Prairies, l'habitude de fumer était plus répandue chez les adolescentes que chez les adolescents. Le recul observé dans la prévalence de l'usage du tabac chez les jeunes (hommes et femmes) vient étayer la conclusion selon laquelle la fréquence de l'initiation au tabac a été beaucoup moins marquée chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes.

Niveau d'instruction et prévalence de l'habitude de fumer (tableaux 8, 9, 10, 12, et 13)

La répartition en fonction de l'habitude de fumer varie beaucoup selon le niveau d'instruction. Le tableau 8 nous montre comment se répartissaient les Canadiens adultes d'après leur niveau d'instruction, et comment se répartissaient les fumeurs d'habitude en fonction de ce même niveau. En considérant les sujets des deux sexes, la proportion des fumeurs d'habitude qui entraient dans la catégorie des répondants ayant de 0 à 8 années de scolarité (21,7 %) allait de pair avec la proportion de l'ensemble des Canadiens dont le niveau de scolarité se situait dans les mêmes limites (21,4 %). Dans le groupe de ceux qui déclaraient avoir fait une partie du secondaire sans avoir jamais accédé à l'enseignement postsecondaire, la proportion de fumeurs réguliers était plus forte que celle à laquelle on pourrait s'attendre compte tenu de la représentation proportionnelle du groupe dans la population. Pour ce qui est des proportions de fumeurs d'habitude répartis dans les autres catégories selon le niveau d'instruction (scolarisés du postsecondaire, titulaires d'un diplôme au niveau postsecondaire et diplômés d'université), elles étaient légèrement inférieures à la proportion des Canadiens qui se retrouvent à l'intérieur de ces catégories.

Les fumeurs réguliers masculins étaient surreprésentés dans le groupe des sujets ayant de 0 à 8 années de scolarité ainsi que dans celui de ceux qui ont terminé une partie du secondaire mais n'ont pas accédé au postsecondaire, et sous-représentés dans les autres groupes en fonction du niveau d'instruction. La répartition des habitudes de fumer était tout à fait différente chez les femmes. La proportion des fumeuses habituelles qui se trouvaient dans le groupe "partie du secondaire, mais pas du postsecondaire" (62,8 %) dépassait largement la proportion de l'ensemble des Canadiennes ayant atteint ce niveau d'instruction (54 %).

En 1981, la plus forte proportion d'habitués de la cigarette s'observait chez ceux qui ont reçu une certaine instruction au niveau secondaire mais qui n'ont pas accédé à l'enseignement postsecondaire (36,4 %), tandis que la proportion la plus faible était le fait des diplômés d'université (19,6 %). Cette répartition valait pour toutes les régions sauf celle de l'Atlantique où le plus fort pourcentage se trouvait chez les sujets ayant de 0 à 8 années de scolarité. Les plus faibles proportions de fumeurs réguliers de cigarettes se trouvaient chez les diplômés d'université, tant pour les hommes (22,3 %) que pour les femmes (15,5 %). Les hommes ayant de 0 à 8 années de scolarité et les femmes ayant terminé une partie du cours secondaire détenaient les plus forts pourcentages de fumeurs, soit 41,7 % et 33,5 %. La plus forte différence que l'on observe d'un niveau d'instruction à l'autre, selon les régions géographiques, se trouvait entre les hommes du Québec ayant de 0 à 8 années de scolarité (52,8 %) et les femmes de la Colombie-Britannique possédant un diplôme universitaire (11,5 %).

Profession et habitude de fumer (tableau 16)

La prévalence de l'usage du tabac à l'intérieur des divers groupes professionnels est un phénomène non négligeable, du fait que cette habitude peut s'unir aux agents physiques et chimiques du milieu de travail pour créer un risque pour la santé, ou pour accroître les dangers qui existent déjà.

Parmi les sujets masculins de la population active, les pourcentages les plus faibles de prévalence de l'usage du tabac s'observaient dans les catégories "professionnels" et "emplois de plein air", suivies de la catégorie "direction". Celles ayant trait au travail de bureau, à la vente et aux services occupaient une place intermédiaire pour ce qui est de l'habitude de fumer. Le plus grand nombre de fumeurs se recrutait parmi les hommes travaillant dans les mines, l'industrie du bâtiment, les transports, les industries de production et "autres" professions. La prévalence de l'usage du tabac chez les hommes qui ne travaillaient pas au moment de notre enquête était faible. Entre 1977 et 1981, la prévalence de l'habitude de fumer a régressé chez les hommes de tous les groupes professionnels. La résistance à l'abandon du tabac se manifestait surtout chez les travailleurs de la construction.

Pour ce qui est des femmes actives, la catégorie des travailleuses "de plein air" était celle qui fumait le moins, suivie du groupe professionnel. Venaient ensuite les vendeuses, les employées de bureau, les femmes engagées dans les industries de production et celles dans les services. Le plus fort pourcentage de fumeuses s'observait chez les femmes qui travaillaient dans les transports et dans les "autres" catégories. Les régressions les plus importantes de l'habitude de fumer chez les femmes de la population active, entre 1977 et 1981, sont apparues dans les groupes de direction, professionnel et travail de bureau. Les femmes travaillant dans les services, les transports et les industries de production étaient les moins susceptibles de réduire leur consommation de tabac.

EXPOSITION AUX RISQUES QUE LE TABAC FAIT COURIR À LA SANTÉ
(tableaux 17 à 33)

Les risques de mortalité et de morbidité varient suivant l'habitude de fumer et selon le degré d'exposition au risque. Les fumeurs réguliers d'aujourd'hui sont beaucoup plus exposés à la mortalité ou à la maladie que ne le sont les ex-fumeurs, les fumeurs occasionnels ou les non-fumeurs. On a établi que le risque est lié au nombre de cigarettes fumées par jour, à la teneur en goudron et en nicotine des cigarettes que l'on fume, à l'habitude d'inhaler la fumée, à la durée de l'habitude de fumer et à l'âge où l'on a commencé à fumer.

Nombre de cigarettes fumées par jour (tableaux 17 à 24)

Les tableaux ayant trait au nombre de cigarettes fumées par jour s'écartent de la présentation tabulaire des rapports antérieurs. Jusqu'à maintenant, le tableau intitulé "Pourcentage de fumeurs réguliers de cigarettes dans la population des 15 ans et plus des deux sexes, selon le nombre de cigarettes fumées par jour", nous renseignait sur la proportion des sujets à l'intérieur de groupes d'âge définis que l'on définissait comme des fumeurs d'habitude consommant un nombre déterminé de cigarettes par jour. C'est ainsi qu'en 1979, dans le groupe d'âge 25-44 ans, 40 % des sujets appartenant à ce groupe étaient des habitués de la cigarette. De l'ensemble des sujets âgés de 25 à 44 ans, 5,3 % fumaient de 1 à 10 cigarettes par jour, 28,7 % de 11 à 25 cigarettes, et 5,6 % plus de 25 cigarettes. Dans le rapport de cette année, la proportion des fumeurs habituels est indiquée et la répartition en pourcentage d'après le nombre de cigarettes fumées par jour se fonde sur l'effectif des fumeurs habituels plutôt que sur la population totale.

Certains lecteurs voudront peut-être découvrir la proportion de toute la population d'un groupe d'âge particulier qui fume régulièrement une quantité définie de cigarettes. Dans ce cas, il est possible de parvenir à une estimation en multipliant la proportion des fumeurs réguliers de ce groupe d'âge par la proportion des fumeurs réguliers qui consomment le nombre indiqué de cigarettes. C'est ainsi qu'en Ontario, dans le groupe des 15 ans et plus, 30,1 % des sujets masculins fumaient régulièrement. À peu près 19,6 % d'entre eux grillaient de 1 à 10 cigarettes par jour. La proportion de l'ensemble de la population dans ce groupe d'âge qui fumait de 1 à 10 cigarettes par jour était donc: .301 x .196 = .059 ou 5,9 %.

Le tableau 18 nous renseigne sur la répartition des habitués de la cigarette, établie d'après le nombre de cigarettes fumées par jour, en 1970 et en 1981. Les statistiques laissent voir une baisse de la proportion des fumeurs d'habitude qui consommaient entre 1 et 10 cigarettes par jour. La proportion des fumeurs qui consommaient plus de 25 cigarettes par jour s'est accrue tant chez les femmes que chez les hommes. L'accroissement relatif atteignait 24 % chez les hommes et 64 % chez les femmes.

Il existe une forte proportion de grands fumeurs en Colombie-Britannique et au Québec, encore que la prévalence de l'habitude de fumer soit la plus faible dans la première et la plus forte dans la deuxième. On peut interpréter ce phénomène de la façon suivante: quand la proportion des fumeurs habituels dans une population décroît à un bas niveau, les individus qui persévèrent forment un groupe davantage biaisé. Cela explique peut-être en partie un usage plus fréquent du tabac chez les répondants de la Colombie-Britannique. Autre explication possible: ceux qui fument des cigarettes pauvres en goudron peuvent compenser un apport moindre en goudron en fumant une plus grande quantité de cigarettes par jour. L'exposition au risque dans le cas de ceux qui consomment plus de 25 unités par jour s'apparenterait aux niveaux d'exposition de ceux qui fument des cigarettes à forte teneur en goudron, mais dont la consommation est moindre sur le plan de la quantité. La proportion de ceux qui fument des cigarettes riches en goudron (16 mg et plus, et cigarettes roulées à la main) est la plus forte au Québec (47,2 %), tandis que la proportion de ceux qui fument des cigarettes pauvres en goudron (0 à 9 mg) atteint son point maximum en Colombie-Britannique.

Le tableau 24 nous montre comment se répartissent les habitués de la cigarette d'après le nombre d'unités fumées par jour, et compte tenu des critères sexe et niveau d'instruction. Dans l'ensemble de la population, la proportion de fumeurs qui consomment plus de 25 cigarettes par jour est la plus forte chez les sujets ayant de 0 à 8 années de scolarité (15,4 %) et chez les diplômés d'université (15,6 %); elle représente une valeur intermédiaire dans les autres catégories selon le niveau d'instruction. À noter que 32,5 % des répondants issus d'une université ont déclaré fumer des cigarettes à faible teneur en goudron, contre 14 % chez ceux ayant de 0 à 8 années de scolarité. À peu près 23 % des répondants du niveau universitaire optaient pour des cigarettes à forte teneur en goudron, comparé à 51 % des sujets ayant de 0 à 8 années de scolarité. Pour en arriver aux pourcentages précités quant aux fortes teneurs en goudron, on a additionné la proportion des adeptes de cigarettes contenant au moins 16 mg de goudron à celle de ceux qui préfèrent rouler eux-mêmes leurs cigarettes.

Parmi la population masculine, 18,9 % des sujets ayant de 0 à 8 années de scolarité fumaient plus de 25 cigarettes par jour, contre 17,1 % dans le cas de ceux qui avaient fréquenté une université. Les proportions dans les autres groupes selon le niveau d'instruction étaient légèrement inférieures à la moyenne pour l'ensemble de ces groupes (15,1 %). Chez les femmes, la plus forte proportion de fumeuses consommant plus de 25 cigarettes par jour s'observait dans le groupe "partie du cours secondaire sans postsecondaire" (9,7 %) ainsi que dans le groupe des diplômés d'université (12,4 %). Du côté des hommes, 27,9 % des sujets ayant fréquenté l'université fumaient des cigarettes à faible teneur en goudron, contre 10,9 % chez ceux ayant de 0 à 8 années de scolarité. Environ 23 % des hommes issus de l'université fumaient des cigarettes à forte teneur de goudron contre 55,8 % dans le cas des fumeurs ayant de 0 à 8 années de scolairté.

Chez les femmes, 42,8 % de celles ayant fait des études universitaires fumaient des cigarettes pauvres en goudron, contre 22,5 % pour le groupe "partie du cours secondaire sans postsecondaire". Les proportions des

femmes adeptes de cigarettes à forte teneur en goudron étaient de 19,2 % et 32,2 % respectivement.

Teneur en goudron des marques de consommation courante (tableaux 25 à 27)

Le constituant "goudron" de la fumée de cigarette renferme probablement une importante proportion des éléments cancérogènes contenus dans toute la fumée. Les tableaux suivants présentent des données relatives à la proportion d'habitués de la cigarette d'après l'apport en goudron de la marque que chacun fume couramment. Les apports en goudron ont été arbitrairement définis de la façon suivante: apport faible (0 à 9 milligrammes), apport moyen (10 à 15 milligrammes) et apport élevé (16 milligrammes et plus). Les cigarettes que l'on roule soi-même entrent dans la catégorie "apport élevé en goudron". Le fait de changer de marque et d'opter pour une cigarette plus pauvre en goudron n'implique pas nécessairement une réduction de l'exposition au risque, puisque les fumeurs peuvent apporter des modifications compensatoires à leurs habitudes de fumer (par exemple accroître leur consommation quotidienne de cigarettes, ou encore inhaler la fumée plus souvent ou plus profondément).

Les tableaux 25 à 27 nous renseignent sur la répartition proportionnelle des habitués de la cigarette d'après l'apport en goudron des marques de consommation courante, chez les 15 ans et plus.

Dix-huit pour cent des adultes canadiens, en 1981, fumaient des cigarettes pauvres en goudron. Les femmes fumant régulièrement affichaient une préférence plus marquée que les hommes pour les cigarettes à faible teneur en goudron (tableau 25).

La proportion des Canadiens fumeurs de cigarettes à forte teneur en goudron atteignait ses taux les plus élevés au Québec (47,2 %) et dans la région de l'Atlantique (43,2 %), tandis que le taux le plus bas (33,1 %) s'observait en Colombie-Britannique. Selon des comparaisons à l'échelle régionale, 23,2 % des adultes de la Colombie-Britannique fumaient des cigarettes pauvres en goudron, comparativement à 13,4 % des fumeurs réguliers de la région atlantique et à 15 % de ceux du Québec. En 1981, environ 21 % des consommateurs de l'Ontario et de la région des Prairies fumaient des cigarettes à faible teneur en goudron (tableau 26).

Si l'on compare les régions entre elles, on constate que la proportion des fumeurs qui consommaient des cigarettes pauvres en goudron représentait à peu près 17 % des fumeurs habituels en Colombie-Britannique, dans la région des Prairies et en Ontario. Au Québec, il y avait environ 12 % d'adeptes des marques à faible teneur en goudron, alors que dans la région de l'Atlantique on en comptait seulement 9 % parmi les hommes qui fumaient régulièrement. En comparant les fumeurs qui ont opté pour des marques à forte teneur en goudron, on s'aperçoit que la proportion de l'ensemble des fumeurs qui consommaient des cigarettes riches en goudron culmine au Québec et dans la région de l'Atlantique. Dans ces deux parties du pays, environ 51 % des habitués de la cigarette chez les hommes optaient pour des marques à forte teneur en goudron (16 mg et plus, en sus des cigarettes roulées à

la main). La proportion des fumeurs adeptes de marques à forte teneur en goudron était de 43,8 % dans la région des Prairies, de 39,2 % en Colombie-Britannique et de 35,4 % en Ontario (tableau 26).

Le fait que les femmes sont plus portées que les hommes à opter pour des cigarettes à faible teneur en goudron apparaît aussi dans les comparaisons établies d'une région à l'autre. En comparant les fumeuses régulières de chaque région, on constate que 30,7 % de celles de la Colombie-Britannique fumaient des cigarettes pauvres en goudron, contre approximativement 19 % des fumeuses du Québec et de la région de l'Atlantique. Ces deux dernières régions fournissaient la plus vaste proportion de fumeuses de la catégorie "apport élevé en goudron". La proportion des femmes qui fumaient des cigarettes pauvres en goudron était de 27 % en Ontario et dans la région des Prairies (tableau 26).

La tendance à fumer des cigarettes à faible teneur en goudron est en relation directe avec le niveau d'instruction des fumeurs. Environ 18 % des fumeurs réguliers optaient pour des marques pauvres en goudron. Seulement 14 % des répondants ayant de 0 à 8 années de scolarité fumaient des cigarettes de ce genre, contre 32 % des répondants ayant fréquenté une université (tableau 27).

Cette relation est plus marquée chez les hommes que chez les femmes. À peu près 11 % des fumeurs masculins qui ont de 0 à 8 années de scolarité consomment des cigarettes à faible teneur en goudron, comparé à 28 % dans le cas de ceux qui possèdent un diplôme universitaire. Chez les femmes, 19 % de celles ayant de 0 à 8 années de scolarité fument des cigarettes pauvres en goudron, contre 43 % de celles ayant reçu un enseignement universitaire. Dans toutes les catégories selon le niveau d'instruction, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de fumer des cigarettes à faible teneur en goudron.

Durée de l'habitude de la cigarette (tableaux 28 et 29)

Les taux globaux de morbidité et de mortalité liées à l'usage de la cigarette laissent voir une relation inverse avec l'âge où se contracte l'habitude de fumer. Le tableau 32 nous indique que 80 % environ des habitués de la cigarette ont commencé de fumer avant d'avoir atteint la vingtaine. À peu près 21 % des hommes et 16 % des femmes se sont mis à fumer avant l'âge de 15 ans. Dans le groupe des 15-19 ans, 29 % des sujets masculins ont commencé de fumer avant l'âge de 15 ans, comparativement à 36 % chez les sujets féminins. Cette constatation cadre parfaitement avec les estimations issues des enquêtes récentes sur l'usage du tabac[1]. Parmi les groupes d'âge plus vieux, les données concernant l'âge où on a pris

[1] Un certain nombre d'enquêtes réalisées par des firmes nationales de sondage pour le compte de la Direction générale des services et de la promotion de la santé ont permis de recueillir des données sur la prévalence de l'usage du tabac chez les adolescents. On peut citer entre autres le Sondage gallup omnibus sur la jeunesse (mai 1982).

l'habitude de fumer appellent à la prudence quant à leur interprétation parce que le souvenir de l'âge où l'on s'est mis à fumer peut être entaché d'imprécision. Par ailleurs, la surmortalité[2] chez les fumeurs de longue date qui est imputable à des maladies liées à l'usage du tabac est un facteur susceptible de réduire la proportion des répondants qui déclarent avoir commencé de fumer à un âge précoce.

Le schéma de l'âge où se contracte l'habitude du tabac chez les femme s'accorde avec le contexte historique de leur habitude de fumer. Les femmes appartenant aux groupes d'âge plus anciens sont beaucoup moins susceptibles de dire qu'elles se sont mises à fumer avant l'âge de 20 ans, et une plus forte proportion d'entre elles en ont contracté l'habitude plus tard dans la vie.

On trouvera dans le tableau 29 des statistiques sur les fumeurs réguliers de cigarettes en fonction des années d'exposition à l'usage du tabac. Environ 48 % des Canadiens et 39 % des Canadiennes ont été exposés aux risques du tabagisme pendant une période de vingt années ou plus. La proportion des sujets masculins ayant fumé pendant vingt ans ou plus est la plus forte au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Chez les femmes, la plus forte proportion de fumeuses de longue date se retrouve en Ontario et en Colombie-Britannique.

---

2 Des études épidémiologiques ont montré que la mortalité générale chez les fumeurs habituels masculins, peu importe la quantité de cigarettes fumées, excède de 70 % celle des non-fumeurs. Voir à ce sujet l'article de Richard Doll intitulé "The Smoking-Induced Epidemic" dans la Revue Canadienne de Santé Publique, vol. 72, nº 6, 1981 (pages 372 à 389).

EFFORTS DE RENONCEMENT AU TABAC
(tableaux 30 à 33)

Dans l'Enquête de 1981, une question visait à déterminer comment les répondants percevaient leurs efforts pour cesser de fumer. La question n° 24 du protocole d'interview s'énonçait ainsi: "A-t-il(elle) ... fait un effort pour cesser de fumer dans les 12 derniers mois?" Les interviewers savaient d'avance que l'effort se définit comme une manifestation de force, ou comme un accomplissement dans lequel intervient la concentration ou une activité particulière. Douze derniers mois s'entendait de la période comprise entre le 1er décembre 1980 et la fin de novembre 1981.

Cette définition laisse place à une grande latitude pour ce qui est du comportement et de la perception de celui-ci quand il s'agit des efforts axés sur la cessation de l'usage du tabac. Le comportement de chacun dans ce domaine peut avoir suivi des schémas tels que le renoncement total pendant de brèves périodes, l'adoption d'une marque de cigarettes à faible teneur en goudron, la réduction de la consommation quotidienne de cigarettes, ou un mélange de ce qui précède. Pour certains individus, n'importe lequel des schémas précités peut avoir été interprété comme une tentative en vue de cesser de fumer.

Le tableau 31 nous renseigne sur la proportion des fumeurs habituels qui ont déclaré avoir fait un effort pour cesser de fumer au cours de l'année précédant l'enquête. Selon les données du tableau, 37 % environ de tous les fumeurs canadiens ont cherché à renoncer au tabac. On note une différence négligeable pour ce qui est de la proportion des hommes et des femmes qui ont tenté un effort en ce sens. Les répondants dans les groupes d'âge plus jeunes sont ceux qui avaient davantage tendance à vouloir s'affranchir de leur habitude.

Les comparaisons à l'échelle régionale révèlent que la proportion de ceux qui ont tenté de renoncer au tabac est plus élevée au Québec que partout ailleurs au Canada. Environ 42 % de Québécois et 46 % de Québécoises ont fait un effort pour cesser de fumer. Parmi les sujets plus jeunes, 44 % des adolescents du groupe 15-19 ans et 50 % du groupe 20-24 ans ont cherché à s'affranchir de leur habitude. De façon générale, les données laissent entendre qu'à l'échelle du pays une proportion substantielle d'hommes et de femmes de tous les groupes d'âge et de toutes les régions ont le sentiment d'avoir fourni un effort pour renoncer au tabac. Peu importe ce que ces données signifient en termes de renoncement réel à l'habitude de fumer, tout cela manifeste une prise de conscience, chez les Canadiens, du bien-fondé de l'abstention.

L'instruction influe grandement sur la perception personnelle des efforts de renoncement au tabac. Dans l'ensemble de la population du Canada, 37 % des fumeurs habituels ont essayé d'abandonner l'usage du tabac. La proportion des fumeurs ayant de 0 à 8 années de scolarité, qui ont déclaré avoir fait un effort en ce sens, était voisine de la moyenne nationale (37,7 %); les répondants qui déclaraient avoir terminé une partie du cours secondaire sans avoir reçu de l'enseignement au niveau postsecondaire étaient un peu moins susceptibles d'avoir fourni un effort (35,8 %).

Cette décroissance était due à la proportion élevée d'habituées de la cigarette de cette catégorie selon le niveau d'instruction, ainsi qu'à la proportion relativement faible de celles qui avaient cherché à renoncer. La proportion des répondants ayant fait un effort pour cesser de fumer s'accroissait généralement avec le niveau d'instruction. Environ 40 % des répondants titulaires d'un certificat ou diplôme d'études postsecondaires, ou encore d'un diplôme universitaire, se sont efforcés de renoncer au tabac (tableau 33).

Chez les hommes, la relation entre les efforts de renoncement et le niveau d'instruction était plus évidente. La proportion des habitués de la cigarette masculins ayant cherché à se défaire de leur manie augmentait avec le niveau d'instruction. Chez les femmes, comme on l'a déjà noté, la catégorie selon le niveau d'instruction où la consommation de tabac était à son plus fort comptait la plus faible proportion de répondantes ayant fait un effort pour s'affranchir de leur habitude.

La proportion des répondants ayant déclaré avoir essayé d'arrêter de fumer dépasse de beaucoup la proportion de ceux qui ont fait un effort manifeste pour réduire leur taux de consommation de tabac, comme on pourra le voir dans l'analyse ci-après.

Efforts manifestes pour réduire le taux de consommation de tabac (tableaux 33 à 36)

On a posé un certain nombre de questions visant à définir les habitués de la cigarette qui sont résolument employés à réduire leur taux de consommation. Le tableau logique de décision régissant la dérivation de la variable fait l'objet d'un exposé en annexe (tableau A). D'après les conditions de classification, tout fumeur ayant décidé de changer pour une marque de cigarettes plus douces et de réduire la quantité fumée par jour était considéré comme ayant fait un effort manifeste pour restreindre son taux de consommation. Par exemple, si un individu avait décidé d'opter pour une marque plus forte, tout en fumant une quantité moindre de cigarettes, on ne considérait pas qu'il avait fourni un effort manifeste. Le premier élément à entrer en ligne de compte quand il s'est agi d'inclure les fumeurs dans la catégorie des "résolus à réduire leur consommation" était de savoir si les habitudes de fumeur entraînaient une réduction de son exposition au goudron durant la période considérée.

La proportion de la population que l'on dit avoir fait un effort manifeste pour réduire sa consommation de tabac est influencée jusqu'à un certain point par la répartition de la population en matière d'usage du tabac. Une région avec un vaste effectif de fumeurs d'habitude consommant des cigarettes à forte teneur en goudron et fumant davantage était réputée avoir de meilleures chances d'ajouter à la coalition des "grands résolus". En conséquence, quiconque veut établir des comparaisons entre les régions géographiques doit en tenir compte. Une analyse plus systématique consisterait à comparer les fumeurs en tenant compte de l'apport en goudron des cigarettes que chacun consommait un an avant la date de l'enquête. Cet élément d'information n'a pas été pris en compte dans l'enquête de 1981.

Le tableau 34 fournit des données estimatives quant à la proportion des habitués de la cigarette qui ont résolument essayé de réduire leur taux de consommation. Cette proportion était légèrement plus élevée chez les femmes (20,3 %) que chez les hommes (18,1 %). Cette tendance est valable pour tous les groupes d'âge à l'exception des 65 ans et plus.

Les comparaisons faites d'une région à l'autre indiquaient que les femmes tendaient davantage que les hommes à réduire leur taux de consommation de tabac. Le contraste le plus frappant apparaissait en Colombie-Britannique où 23,9 % des femmes ont fait un effort manifeste pour restreindre leur consommation, comparativement à 17,8 % des hommes (tableau 35).

Les fumeurs hommes de la région atlantique, du Québec et des Prairies avaient moins tendance à réduire leur taux de consommation de tabac, tandis que leurs pairs de Colombie-Britannique et d'Ontario étaient plus portés à le faire. Chez les femmes, les plus faibles proportions d'habituées de la cigarette ayant fait un effort manifeste pour réduire leur consommation se retrouvaient au Québec et dans la région atlantique; les proportions les plus élevées s'observaient en Colombie-Britannique, en Ontario et dans la région des Prairies.

Les efforts pour réduire le taux de consommation tabagique paraissent être un phénomène sur lequel le niveau d'instruction des individus n'a guère d'influence. Environ 19,1 % de l'ensemble des fumeurs habituels ont fait un effort manifeste pour réduire leur consommation. En considérant la population totale de plus de 15 ans, la proportion la plus forte de "résolus" (21,3 %) se retrouvait chez les sujets ayant étudié au niveau postsecondaire. La plus faible proportion de tentatives de réduction (18,5 %) était le fait des fumeurs ayant de 0 à 8 années de scolarité (tableau 36).

Chez les hommes, les diplômés d'université représentaient la proportion la plus élevée (21,8 %), tandis que les fumeurs dont la période de scolarité se situait entre 0 et 8 ans avaient la proportion la plus faible (17,4 %). Du côté des femmes, la répartition différait légèrement, la plus forte proportion de tentatives de réduction s'observant chez les fumeuses qui ont étudié un certain temps au niveau postsecondaire (26 %), et la plus faible chez les diplômées d'université (18,9 %).

Abandon du tabac (tableaux 37 à 39)

Le tableau 37 présente des données sur les taux d'abandon chez les Canadiens ayant déjà fumé régulièrement. Le taux d'abandon s'obtient en divisant le nombre d'anciens fumeurs habituels par le nombre de ceux qui ont déjà fumé à l'intérieur de chaque groupe d'âge démographique pertinent.

Tant chez les hommes que chez les femmes, la proportion de ceux qui ont fumé régulièrement et qui ont renoncé au tabac par la suite s'accroît avec l'âge du fumeur. Toutefois, dans chaque groupe d'âge, le pourcentage des fumeurs qui renoncent à leur habitude est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, à l'exception des groupes d'âge 15-19 ans et 20-24 ans. Les taux d'abandon plus élevés pour les deux sexes dans les groupes plus âgés sont peut-être liés à la surmortalité éventuelle des fumeurs de longue date. Pour peu que la mortalité réduise le nombre de ceux qui ont déjà fumé, il y aura "gonflement" des taux d'abandon.

Les groupes d'âge le moins susceptibles d'être touchés par le problème inhérent à un biais de mortalité sont les plus jeunes. Parmi ces groupes, les taux d'abandon présentent quelque intérêt du fait que les données ne viennent pas étayer l'opinion selon laquelle les jeunes femmes ont moins tendance à renoncer à l'habitude de fumer. Chez les 15 à 19 ans, les filles présentent un taux d'abandon presque deux fois supérieur à celui des garçons. Ce taux est aussi plus élevé chez les fumeuses âgées de 20 à 24 ans.

Les taux d'abandon plus élevés chez les fumeuses appartenant aux deux groupes moins âgés illustrent peut-être le fait que les Canadiennes commencent de fumer plus jeunes que leurs pairs masculins. Cette situation tient peut-être d'autre part à un biais systématique dans la déclaration des habitudes de fumer chez les jeunes femmes. Pour le moment cependant, aucune preuve irréfutable ne justifie cette dernière hypothèse.

Ex-fumeurs réguliers (tableaux 38 et 39)

(Personnes qui fumaient régulièrement mais qui ne fument maintenant ni la pipe, ni la cigarette, ni le cigare.)

En décembre 1981, il y avait au Canada 2 813 686 anciens fumeurs. Ce chiffre représentait 15,3 % de la population de 15 ans et plus. La proportion et le nombre d'anciens habitués du tabac étaient alors plus élevés chez les hommes que chez les femmes. On comptait parmi ces ex-fumeurs 1 776 438 sujets de sexe masculin contre 1 037 248 femmes. Ces estimations représentaient 19,7 % de la population masculine et 11 % de la population féminine. La proportion d'anciens fumeurs réguliers augmentait en fonction de l'âge des sujets, sauf chez les femmes de 65 ans et plus. Les proportions d'anciens habitués du tabac dans la population masculine étaient généralement plus élevées dans chacun des groupes d'âge au delà de 24 ans. Les proportions d'anciens fumeurs dans les groupes 15-19 ans et 20-24 ans étaient plus fortes chez les femmes.

Le rapport entre les ex-fumeurs et ceux qui fument régulièrement est à noter compte tenu du fait que les ex-fumeurs représentent un modèle pour les fumeurs réguliers qui voudraient renoncer à leur habitude. Chez les sujets des deux sexes, le rapport entre les ex-fumeurs et ceux qui fument régulièrement décroît en foncton de l'âge. La courbe de régression est plus prononcée parmi la population féminine. Chez les gens plus âgés, en règle générale, on rencontre un plus grand nombre d'ex-fumeurs que de

fumeurs persévérants. Cela n'est peut-être pas sans relation avec une tendance à renoncer au tabac à mesure que l'on avance en âge, ainsi qu'avec la surmortalité éventuelle qui peut frapper les fumeurs de longue date.

Le rapport entre les fumeurs habituels et ceux qui ont déjà fumé régulièrement était à son plus fort au Québec et à son plus faible en Colombie-Britannique, tant pour les hommes que pour les femmes. Cette constatation s'accorde avec le contexte historique des tendances en matière de consommation de tabac dans ces deux régions.

Les non-fumeurs (tableaux 40 à 46)

Depuis 1965, la proportion de non-fumeurs au Canada (le terme "non-fumeurs" désignant les répondants qui ne fument ni la pipe, ni la cigarette, non plus que le cigare) a augmenté de 11,6 %. L'effectif des non-fumeurs s'est accru de 21,2 % chez les hommes, tandis que chez les femmes la progression était de seulement 2,2 % au cours de cette période. L'accroissement plus élevé du nombre de non-fumeurs parmi la population masculine traduit le fait qu'un pourcentage beaucoup plus fort d'hommes fumaient au début de la période considérée.

En décembre 1981, il y avait en tout 11 390 396 non-fumeurs (61,8 % de la population) chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, dont 5 050 936 sujets de sexe masculin (56 %) et 6 339 410 sujets de sexe féminin 67,5 %).

Si l'on jette un coup d'oeil à la répartition par âge et par sexe des non-fumeurs, on constate que la plus forte proportion des sujets masculins qui ne fument pas se recrutait dans le groupe d'âge 15-19 ans (72,6 %). La proportion de non-fumeurs régressait à 49,7 % dans le groupe d'âge 25-44 ans, et elle grimpait à 70,5 % dans le groupe des 65 ans et plus. La courbe de répartition des non-fumeuses était différente de celle des non-fumeurs. Les non-fumeuses représentaient 72,3 % du groupe des 15-19 ans, mais leur nombre régressait au point le plus bas dans la tranche d'âge 20-24 ans (54,7 %), tandis qu'il s'élevait à 86,6 % chez les 65 ans et plus. Ces structures par âge et par sexe de la prévalence des non-fumeurs n'ont guère changé au cours de chaque enquête menée depuis 1965, ce qui reflète bien les divergences historiques en matière d'usage du tabac chez les hommes et les femmes.

La proportion de non-fumeurs chez les 15 ans et plus varie selon la région et le niveau d'instruction. En 1981, la Colombie-Britannique avait le plus fort pourcentage de non-fumeurs (67,1 %) alors que le pourcentage le plus faible (55,8 %) se trouvait au Québec. Depuis 1965, la progression la plus marquée de l'effectif des non-fumeurs a été signalée en Colombie-Britannique (14,6 %) et la plus faible, dans la région atlantique (7,8 %). La plus faible proportion de non-fumeurs au Canada se rencontre chez la population masculine du Québec dans le groupe d'âge 45-64 ans (41,5 %). Le pourcentage global (48,8 %) est aussi le plus faible au Québec. Depuis 1965, c'est au Québec encore que le taux d'accroissement à la fois absolu (23,4 %) et relatif (92,1 %) du nombre d'hommes non fumeurs a été le plus marqué.

Depuis 1965, la plus forte augmentation tant absolue (8,5 %) que relative (13,6 %) de la proportion de non-fumeuses est survenue en Colombie-Britannique. Cette proportion a accusé un recul dans la région atlantique (1,9 %) tandis qu'elle demeurait stable au Québec. Elle a connu de légères augmentations en termes absolus dans la région des Prairies (2 %) et en Ontario (3,3 %).

En 1981, les non-fumeurs se recrutaient le plus souvent chez ceux qui avaient un grade universitaire (73 %) et le pourcentage le plus faible était observé chez les répondants ayant déclaré avoir terminé leurs études au secondaire. La proportion des non-fumeurs tant masculins que féminins était la plus élevée chez les sujets ayant fréquenté l'université, soit 68,1 % et 80,9 %. Le plus faible pourcentage de non-fumeurs se rencontrait chez ceux ayant étudié pendant une période de 0 à 8 ans (50,5 %), tandis que le plus faible pourcentage de non-fumeuses était observé chez les femmes ayant fait des études secondaires mais sans accéder à l'enseignement postsecondaire (63 %).

Si l'on considère l'abstention tabagique en fonction du niveau d'instruction des sujets d'une région à l'autre, on s'aperçoit que le plus faible pourcentage de non-fumeurs se rencontre chez ceux dont le niveau de scolarité se situe entre 0 et 8 ans, dans la région atlantique et au Québec. En Ontario, la proportion des non-fumeurs chez ceux qui ont étudié pendant une période de 0 à 8 ans et chez ceux qui ont déjà fréquenté l'école secondaire est à peu près la même. Dans la région des Prairies et en Colombie-Britannique, le plus faible pourcentage de non-fumeurs se rencontre dans le groupe de ceux qui ont fait des études secondaires mais qui n'ont jamais fréquenté un établissement du niveau postsecondaire.

CONSOMMATION INTÉRIEURE DE PRODUITS DU TABAC, AU CANADA, DE 1968 À 1981

La consommation estimative de cigarettes par habitant a affiché une remarquable stabilité entre 1968 et 1981. Le tableau 47 donne une estimation des ventes nationales de produits du tabac ainsi que de la consommation de produits du tabac par habitant, au Canada, entre 1968 et 1981. Durant cette période-là, les ventes nationales de cigarettes manufacturées ont grimpé de 43,8 %, un accroissement d'environ 3,4 % par année. Dans le même temps, les ventes de cigares régressaient de 462 millions en 1968 à 414 millions en 1981. Le tabac haché fin est normalement utilisé par les consommateurs qui roulent leurs propres cigarettes. La consommation de ce type de tabac a, elle aussi, manifesté une tendance à la baisse. En 1968, il s'est vendu près de 7,03 millions de kilogrammes de tabac haché fin contre 4,76 millions de kilogrammes en 1981.

Les estimations du nombre de fumeurs proviennent des questionnaires sur l'usage du tabac dans le cadre des enquêtes sur la population active, tandis que les estimations relatives au nombre total de cigarettes consommées ont été faites à partir des statistiques portant sur la production et la disposition des produits du tabac. Le tableau 48 présente des chiffres estimatifs de la consommation moyenne quotidienne de cigarettes par fumeur, au Canada, entre 1965 et 1981.

Si l'on cherche à concilier l'estimation du nombre total de cigarettes consommées faite d'après les statistiques sur les ventes avec les estimations en provenance de l'Enquête sur la population active qui se fondent sur la prévalence et la fréquence de l'usage du tabac, on s'apercevra que ces dernières sont moindres. Bien des raisons expliquent pourquoi ces estimations ne concordent pas.

- Le personnel militaire, les sujets vivant en établissement et les Autochtones ne sont pas pris en compte dans l'Enquête sur la population active. Ces populations, qui recèlent peut-être un grand nombre de fumeurs invétérés, représentent à peu près deux pour cent de la population de plus de 15 ans.

- L'enquête ne tient pas compte des habitants du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

- Les ventes de cigarettes aux touristes ou aux visiteurs représentent peut-être une petite proportion de la consommation globale.

- Les estimations faites à partir de l'Enquête sur la population active ne tiennent pas compte des stocks de cigarettes qui se trouvent en entrepôt ou encore sur les rayons des points de vente au détail.

- Les normes sociales pour ce qui est de l'usage de la cigarette ont évolué ces dernières années. Au yeux d'une proportion sans cesse croissante de la population, fumer passe pour être une attitude

négative en société. En conséquence, il se peut que les répondants aient tendance à sous-estimer et leur propre taux de consommation de tabac et celui des autres membres de leur famille.

Néanmoins, si l'on tient pour acquis que le degré de sous-estimation quant à la prévalence de l'usage du tabac lors de l'Enquête sur la population active n'a guère changé au fil des ans, et compte tenu du fait que la proportion de produits du tabac consommés par les groupes de la population non visés par ladite enquête est demeurée constante elle aussi, la tendance séculaire de la consommation moyenne quotidienne par fumeur peut nous fournir une mesure indirecte de l'accroissement relatif de la consommation quotidienne au cours de la période considérée.

Pour peu que les hypothèses précédentes soient valides, il apparaît que la consommation quotidienne de cigarettes par habitant a augmenté dans une proportion d'environ 26 %, entre 1965 et 1981.

Au Canada, comme dans le reste du monde, les apports moyens en goudron des cigarettes (moyennes pondérées à partir des ventes) ont considérablement diminué. Le graphique 1 montre la décroissance des émissions moyennes de goudron (moyennes pondérées à partir des ventes) en milligrammes par cigarette pour ce qui est des marques canadiennes, durant la période de 1968 à 1981. La moyenne des émissions de goudron pondérée en fonction des ventes a diminué de 21,1 mg en 1968 à 13,5 mg en 1981, soit une chute relative de 36 %. La part du marché des marques canadiennes à faible teneur en goudron, ces marques étant arbitrairement définies comme celles dont l'apport nominal en goudron est inférieur ou égal à 12 mg, représentait 8,3 % en 1973 et 34,3 % en 1981 (graphique 2).

La signification latente du mouvement de transition vers des cigarettes à plus faible teneur en goudron est encore incertaine quant à l'exposition au risque. En regroupant les données sur les ventes de cigarettes et sur la prévalence de l'usage du tabac, on arrive à prouver de façon indirecte que les fumeurs réguliers ont augmenté le nombre de cigarettes consommées par jour (tableau 48). Les réponses fournies au cours de l'enquête tendent également à prouver qu'un pourcentage plus élevé de fumeurs consomment plus de 25 cigarettes par jour (tableau 18).

Certains fumeurs cherchent peut-être à se "rattraper" en augmentant le nombre de cigarettes fumées par jour. Dans un tel cas, le niveau potentiel d'exposition aux substances nocives (goudron et nicotine) peut être semblable aux niveaux auxquels sont soumis les fumeurs qui consomment des cigarettes à forte teneur en goudron et en nicotine.

CONCLUSIONS

L'enquête de 1981 sur le comportement des Canadiens face au tabac met en évidence une sorte de continuité dans le recul séculaire des taux de prévalence de l'usage du tabac au Canada. Entre 1966 et 1981, le pourcentage d'adultes masculins qui fumaient régulièrement la cigarette est tombé d'environ 54 % à 37 %. Dans le même temps, les taux de prévalence de l'usage du tabac chez les femmes régressaient de 31 % à 29 % (graphiques 3 et 4).

Étant donné la croissance démographique au cours de la période considérée, la diminution nette de la prévalence de l'usage régulier du tabac lié à la cigarette dans la population de 15 ans et plus ne correspond pas à une diminution du nombre absolu de fumeurs de cigarettes. Bien que le pourcentage des adultes fumeurs d'habitude soit tombé d'environ 42,8 % en 1966 à environ 32,7 % en 1981, le nombre total des Canadiens fumant régulièrement la cigarette est passé d'environ 5,7 millions en 1966 à 6 millions en 1981. Cette progression relativement faible reflète l'effet net d'une baisse estimative de 9,2 % du nombre absolu de fumeurs et d'un accroissement de 29 % du nombre absolu de fumeuses.

Une proportion substantielle de fumeurs réguliers ont opté pour des cigarettes à faible teneur en goudron. On a tout lieu de croire que les habitués de la cigarette fument davantage de cigarettes par jour. Les changements compensatoires des habitudes de fumer chez les adeptes des cigarettes pauvres en goudron ou en nicotine pourraient conduire à des taux d'exposition aux constituants nocifs du tabac semblables à ceux auxquels sont soumis les consommateurs de cigarettes à forte teneur en goudron.

TABLEAU 1

POURCENTAGE DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, PAR TYPE D'USAGE DU TABAC, SEXE ET GROUPE D'ÂGE, CANADA, 1981

SEXE ET GROUPE D'ÂGE	TOTAL	NON-FUMEURS	FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES	FUMEURS OCCASIONNELS DE CIGARETTES	FUMEURS DE PIPE OU DE CIGARES SEULEMENT
LES DEUX SEXES					
TOTAL DES 15 ANS ET PLUS (EN MILLIERS)	18,420.4	61.8%	32.7%	3.5%	2.0%
15-19	2,205.0	72.4	23.1	4.2	*
20-24	2,329.2	54.7	40.4	4.2	*
25-44	7,081.5	56.3	38.0	3.5	2.2
45-64	4,568.4	60.4	33.7	3.2	2.7
65 ANS ET PLUS	2,236.3	79.2	15.3	2.4	3.1
TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	16,215.4	60.4	34.0	3.4	2.2
HOMMES					
TOTAL DES 15 ANS ET PLUS (EN MILLIERS)	9,026.3	56.0	36.7	3.4	
15-19	1,123.3	72.6	22.8	4.1	*
20-24	1,175.3	54.7	39.9	3.9	*
25-44	3,531.6	49.7	42.6	3.5	4.2
45-64	2,227.4	52.2	39.3	3.2	5.3
65 ANS ET PLUS	968.6	69.5	21.3	2.3	6.9
TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	7,902.6	53.6	38.7	3.3	4.4
FEMMES					
TOTAL DES 15 ANS ET PLUS (EN MILLIERS)	9,394.1	67.5	28.9	3.5	*
15-19	1,081.7	72.3	23.4	4.3	*
20-24	1,153.7	54.7	40.8	4.5	*
25-44	3,549.9	62.9	33.4	3.6	*
45-64	2,341.0	68.1	28.5	3.2	*
65 ANS ET PLUS	1,267.7	86.6	10.8	2.5	*
TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	8,312.4	66.9	29.6	3.4	*

Notes: * Pourcentage basé sur une population trop réduite pour être représentative.
Q Forte variance de l'échantillonnage, utiliser avec précaution.
La somme des pourcentages peut ne pas donner 100 parce qu'ils ont été arrondis.

Source: Statistique Canada, Supplément de l'Enquête sur la population active, décembre 1981.

TABLEAU 2

NOMBRE ET POURCENTAGE ESTIMATIFS DE FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, PAR SEXE ET GROUPE D'ÂGE, CANADA, 1981

SEXE	GROUPE D'ÂGE	POPULATION TOTALE (N) (EN MILLIERS)	FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES	
			NOMBRE (n) (EN MILLIERS)	POURCENTAGE
LES DEUX SEXES	TOTAL DES 15 ANS ET PLUS	18,420.4	6,023.1	32.7%
	15 - 19	2,205.0	509.0	23.1
	20 - 24	2,329.2	940.3	40.4
	25 - 44	7,081.5	2,689.5	38.0
	45 - 64	4,568.4	1,541.2	33.7
	65 ANS ET PLUS	2,236.3	343.1	15.3
	TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	16,215.4	5,514.1	34.0
HOMMES	TOTAL DES 15 ANS ET PLUS	9,026.3	3,310.7	36.7
	15 - 19	1,123.4	256.0	22.8
	20 - 24	1,175.5	469.3	39.9
	25 - 44	3,531.6	1,504.2	42.6
	45 - 64	2,227.4	875.0	39.3
	65 ANS ET PLUS	968.6	206.1	21.3
	TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	7,902.9	3,054.7	38.7
FEMMES	TOTAL DES 15 ANS ET PLUS	9,394.1	2,712.4	28.9
	15 - 19	1,081.7	253.0	23.4
	20 - 24	1,153.7	471.0	40.8
	25 - 44	3,549.9	1,185.3	33.4
	45 - 64	2,341.0	666.2	28.5
	65 ANS ET PLUS	1,267.7	136.9	10.8
	TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	8,312.4	2,459.4	29.6

Source: Statistique Canada, Supplément de l'Enquête sur la population active, décembre 1981.

TABLEAU 3

POURCENTAGE DE FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES CHEZ LES HOMMES DE 15 ANS ET PLUS, PAR RÉGION ET PAR GROUPE D'ÂGE, CANADA, DE 1966 À 1981(a)

GROUPE D'ÂGE	ANNÉE	CANADA	ATLANTIQUE	QUÉBEC	ONTARIO	PRAIRIES	COLOMBIE-BRITANNIQUE
TOTAL DES 15 ANS ET PLUS	1966	53.6	53.6	63.8	50.3	46.5	48.1
	1972	47.4	48.0	57.1	43.8	42.0	41.8
	1975	43.3	44.5	50.4	40.6	39.5	39.2
	1977	40.8	43.5	47.8	38.2	37.9	34.0
	1979	38.6	40.4	47.4	34.4	36.0	33.2
	1981	36.7	39.1	44.9	33.1	34.2	30.5
15 - 19	1966	35.1	34.3	47.7	29.4	27.9	26.6 Q
	1972	35.0	37.5	44.0	30.4	31.2	27.4
	1975	29.5	31.2	40.7	22.2	25.4	27.2
	1977	26.9	27.5	31.3	24.5 Q	25.8	*
	1979	26.8	29.5	37.3	18.9	26.5	24.8 Q
	1981	22.8	27.0	31.8	18.5	19.2	16.4
20 - 24	1966	60.1	59.7	69.1	57.6	49.1	56.5
	1972	52.6	53.9	61.3	47.8	47.5	49.5
	1975	48.3	52.5	59.2	40.8	44.4	43.4
	1977	45.2	49.2	48.3	42.0	45.6	42.3 Q
	1979	42.3	47.9	50.3	39.4	39.5	29.5 Q
	1981	39.9	45.2	44.5	38.2	36.2	35.2
25 - 44	1966	61.8	66.0	71.7	57.7	54.5	56.0
	1972	53.3	54.1	62.2	50.4	47.0	47.9
	1975	48.3	49.4	50.2	49.7	45.7	41.9
	1977	47.0	50.9	53.5	44.7	44.3	39.6
	1979	44.0	44.6	52.8	39.8	41.3	39.4
	1981	42.6	44.3	48.7	39.2	42.6	37.3
45 - 64	1966	57.8	59.2	67.7	54.6	51.1	52.8
	1972	50.0	52.2	61.4	45.4	44.9	43.3
	1975	46.5	47.2	55.8	42.6	43.0	41.8
	1977	42.3	45.7	52.5	38.9	37.8	33.9
	1979	40.5	45.0	48.8	36.8	36.7	35.2
	1981	39.3	41.2	51.4	35.0	33.9	32.1
65 ANS ET PLUS	1966	32.3	28.2	37.2	31.9	31.1	30.0
	1972	30.4	28.4	39.2	28.2	28.7	23.3 Q
	1975	29.3	31.6	37.4	23.9	26.0	32.4
	1977	27.5	30.1	37.1 Q	25.3 Q	24.4	*
	1979	24.6	22.9	31.4	21.9	24.1	21.8 Q
	1981	21.3	25.5	29.9	17.5	19.9	14.9
TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	1966	56.7	57.5	66.7	53.6	49.5	51.0
	1972	49.5	50.2	59.5	46.0	43.8	43.8
	1975	45.6	47.2	52.1	43.5	42.0	41.0
	1977	43.0	46.4	50.6	40.4	39.9	35.4
	1979	40.4	42.3	49.0	36.7	37.5	34.3
	1981	38.7	41.1	46.7	35.0	33.9	32.1

Notes: (a) Les données sur les groupes d'âge par région ne sont pas disponibles pour 1965 et 1970. Les années 1966 et 1972 servent d'années de référence.

Q Forte variance d'échantillonnage, utiliser avec précaution.

* Pourcentage basé sur une population trop réduite pour être représentative.

Source: Statistique Canada, Suppléments de l'Enquête sur la population active.

TABLEAU 4

POURCENTAGE DE FUMEUSES RÉGULIÈRES DE CIGARETTES CHEZ LES FEMMES DE 15 ANS ET PLUS, PAR RÉGION ET PAR GROUPE D'ÂGE, CANADA, DE 1966 À 1981(a)

GROUPE D'ÂGE	ANNÉE	CANADA	ATLANTIQUE	QUÉBEC	ONTARIO	PRAIRIES	COLOMBIE-BRITANNIQUE
TOTAL DES 15 ANS ET PLUS	1966	32.1	28.8	33.4	31.5	30.3	36.5
	1972	32.4	29.8	37.2	29.6	31.0	33.3
	1975	31.4	30.3	34.6	30.1	29.9	30.3
	1977	31.1	32.5	35.5	28.8	29.8	28.8
	1979	30.1	30.1	34.6	27.9	29.6	26.9
	1981	28.9	29.0	33.4	27.2	27.1	26.1
15 - 19	1966	20.0	17.8	23.7	17.6	18.0	24.4 Q
	1972	28.4	25.2	38.6	23.1	25.9	24.8 Q
	1975	27.4	24.4	33.3	24.2	26.3	26.4
	1977	26.7	28.1	32.8	22.2 Q	24.1	28.2 Q
	1979	26.0	22.8	33.0	22.3	25.9	23.1 Q
	1981	23.4	21.2	32.4	19.4	23.2	16.6
20 - 24	1966	43.4	40.5	41.8	42.9	44.7	50.0
	1972	40.6	38.6	46.3	37.3	39.6	38.3
	1975	38.3	40.5	40.9	33.1	39.7	43.1
	1977	40.7	43.1	49.6	36.7	38.2	31.4 Q
	1979	39.8	42.6	45.9	34.6	40.5	37.9
	1981	40.8	39.0	48.1	40.3	38.0	30.6
25 - 44	1966	31.4	41.1	41.2	40.2	40.5	43.8
	1972	38.8	37.7	43.3	34.7	39.6	40.7
	1975	37.0	38.8	39.3	36.1	36.6	33.1
	1977	36.6	40.4	39.6	33.6	37.7	34.3
	1979	36.0	38.2	40.6	33.1	36.1	31.9
	1981	33.4	37.4	37.2	30.6	32.2	31.6
45 - 64	1966	31.7	26.7	32.5	32.4	27.6	38.1
	1972	31.6	27.4	32.9	31.6	29.2	35.3
	1975	31.8	27.4	36.1	31.9	27.4	30.8
	1977	30.5	29.8	33.8	29.5	27.8	29.5
	1979	28.9	27.0	32.3	29.0	25.3	26.5
	1981	28.5	27.2	31.5	28.4	24.9	27.0
65 ANS ET PLUS	1966	8.3	*	7.7 Q	7.8 Q	*	15.3 Q
	1972	10.4	*	12.8	9.7 Q	8.6 Q	10.9 Q
	1975	10.8	7.8 Q	9.3 Q	12.0	11.3 Q	12.3 Q
	1977	12.0	10.4 Q	*	12.5 Q	9.9 Q	*
	1979	10.6	9.2 Q	10.3 Q	10.7 Q	12.4	*
	1981	10.8	7.7	12.0	10.8	8.8	13.5
TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	1966	34.0	31.1	35.1	33.5	32.3	38.4
	1972	33.0	30.6	36.9	30.6	31.7	34.4
	1975	32.0	31.4	34.8	31.0	30.5	30.8
	1977	31.8	33.2	35.9	29.7	30.7	28.9
	1979	30.7	31.3	34.9	28.7	30.2	27.4
	1981	29.6	30.2	33.5	28.2	27.6	27.2

Notes: (a) Les données sur les groupes d'âge par région ne sont pas disponibles pour 1965 et 1970. Les années 1966 et 1972 servent d'années de référence.
Q Forte variance d'échantillonnage, utiliser avec précaution.
* Pourcentage basé sur une population trop réduite pour être représentative.

Source: Statistique Canada, Suppléments de l'Enquête sur la population active.

TABLEAU 5

RÉPARTITION ESTIMATIVE PAR ÂGE ET PAR SEXE DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, SELON LA PROVINCE, CANADA, 1981

	CANADA	PROVINCES									
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QUÉBEC	ONTARIO	MAN.	SASK.	ALBERTA	C.-B.
LES DEUX SEXES											
TOTAL											
15 ANS ET PLUS.....	18,420,364	413,992	91,603	638,664	525,456	4,914,970	6,655,517	760,200	717,959	1,614,359	2,087,644
15 - 19.....	2,205,006	64,359	12,559	81,153	69,800	587,185	785,164	88,990	88,843	198,102	228,853
20 - 24.....	2,329,183	58,986	11,517	81,648	69,742	628,634	818,920	91,759	89,371	234,012	244,595
25 - 44.....	7,081,466	161,060	32,402	235,701	199,672	1,936,509	2,518,327	276,296	247,502	675,293	798,705
45 - 64.....	4,568,408	86,658	21,004	151,031	118,987	1,218,908	1,716,153	190,130	180,429	355,610	529,499
65 ANS ET PLUS.....	2,236,302	42,930	14,121	89,132	67,256	543,735	816,933	113,026	111,815	151,343	285,993
20 ANS ET PLUS.....	16,215,358	349,633	79,044	557,511	455,656	4,327,785	5,870,354	671,210	629,116	1,416,257	1,858,791
HOMMES											
TOUS ÂGES											
15 ANS ET PLUS.....	9,026,309	209,356	45,027	309,299	258,522	2,394,637	3,245,401	370,389	358,646	809,958	1,025,075
15 - 19.....	1,123,351	32,866	6,426	40,784	35,645	299,180	401,021	45,129	45,617	100,130	116,554
20 - 24.....	1,175,459	30,307	5,864	40,491	35,475	317,093	414,271	46,481	45,944	117,499	122,035
25 - 44.....	3,531,549	81,798	16,039	116,235	100,071	965,270	1,246,279	137,612	125,603	344,072	398,571
45 - 64.....	2,227,383	44,225	10,302	72,668	57,455	584,569	838,414	91,415	89,297	179,027	260,012
65 ANS ET PLUS.....	968,567	20,160	6,396	39,121	29,876	228,526	345,416	49,752	52,186	69,231	127,904
20 ANS ET PLUS.....	7,902,958	176,490	38,601	268,515	222,877	2,095,457	2,844,380	325,260	313,030	709,828	908,521
FEMMES											
TOUS ÂGES											
15 ANS ET PLUS.....	9,394,055	204,637	46,576	329,366	266,935	2,520,332	3,410,116	389,312	359,312	804,401	1,062,569
15 - 19.....	1,081,655	31,493	6,133	40,369	34,155	288,005	384,143	43,861	43,226	97,972	112,299
20 - 24.....	1,153,724	28,679	5,653	41,157	34,267	311,541	404,650	45,278	43,427	116,513	122,560
25 - 44.....	3,549,917	79,262	16,363	119,466	99,601	971,238	1,272,048	138,684	121,899	331,222	400,135
45 - 64.....	2,341,025	42,433	10,702	78,363	61,532	634,340	877,739	98,715	91,132	176,583	269,487
65 ANS ET PLUS.....	1,267,735	22,770	7,725	50,011	37,380	315,209	471,537	63,274	59,629	82,112	158,089
20 ANS ET PLUS.....	8,312,400	173,144	40,443	288,997	232,780	2,232,327	3,025,974	345,951	316,087	706,429	950,270

Source: Estimations faites à partir de l'Enquête sur la population active, décembre 1981.

TABLEAU 6

NOMBRE DE FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES CHEZ LES 15 ANS ET PLUS, PAR SEXE, GROUPE D'ÂGE ET PROVINCE, CANADA 1981

	FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES										
		PROVINCES									
	CANADA	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QUÉBEC	ONTARIO	MAN.	SASK.	ALBERTA	C.-B.
LES DEUX SEXES											
TOTAL											
TOUS ÂGES											
15 ANS ET PLUS.....	6,023,140	139,641	27,760	218,228	182,013	1,916,758	2,000,916	223,190	196,204	528,460	589,970
15 - 19.....	509,005	13,087	*	20,433	18,862	188,298	148,451	20,015	14,537	45,086	37,673
20 - 24.....	940,331	26,347	4,114	35,034	27,981	291,098	321,239	34,851	28,198	91,048	80,422
25 - 44.....	2,689,494	65,571	12,187	95,896	83,474	830,978	877,287	96,174	88,874	263,912	275,142
45 - 64.....	1,541,171	28,680	6,447	53,435	40,098	500,358	542,673	54,456	50,540	108,070	156,413
65 ANS ET PLUS.....	343,140	5,956	*	13,430	11,598	106,027	111,267	17,694	14,055	20,345	40,320
20 ANS ET PLUS.....	5,514,135	126,554	25,197	197,794	163,151	1,728,460	1,852,465	203,175	181,668	483,374	552,297
HOMMES											
TOUS ÂGES											
15 ANS ET PLUS.....	3,310,717	82,342	14,911	119,910	104,589	1,074,626	1,074,140	122,654	106,232	298,213	313,100
15 - 19.....	255,979	8,016	*	11,780	10,148	95,029	74,015	9,649	6,872	20,113	19,085
20 - 24.....	469,320	15,265	*	17,445	16,622	141,255	158,358	18,632	13,822	43,601	42,928
25 - 44.....	1,504,207	35,037	6,545	53,158	44,545	469,748	488,095	53,559	47,809	157,188	148,523
45 - 64.....	875,016	19,034	3,927 Q	28,896	24,295	300,253	293,225	29,301	28,571	63,950	83,564
65 ANS ET PLUS.....	206,195	4,990	*	8,632	8,979	68,341	60,446	11,514	9,159	13,360	19,000
20 ANS ET PLUS.....	3,054,738	74,326	13,639	108,130	94,441	979,597	1,000,124	113,005	99,360	278,100	294,015
FEMMES											
TOUS ÂGES											
15 ANS ET PLUS.....	2,712,423	57,299	12,849	98,318	77,424	842,132	926,777	100,536	89,972	230,247	276,870
15 - 19.....	253,026	5,071	*	8,653	8,714	93,268	74,436	10,366	7,665	24,973	18,588
20 - 24.....	471,011	11,082	2,721 Q	17,589	11,360	149,843	162,881	16,220	14,376	47,446	37,494
25 - 44.....	1,185,288	30,534	5,642 Q	42,738	38,929	361,230	389,192	42,614	41,065	106,723	126,620
45 - 64.....	666,154	9,646	2,520 Q	24,539	15,803	200,105	249,448	25,156	21,969	44,120	72,849
65 ANS ET PLUS.....	136,944	*	*	4,798	2,619	37,686	50,821	6,180	4,897	6,984	21,320
20 ANS ET PLUS.....	2,459,397	52,228	11,557	89,664	68,710	748,863	852,341	90,170	82,308	205,274	258,282

* Évaluation de la population trop faible pour être représentative.

Q Forte variance de l'échantillonnage, utiliser avec précaution.

TABLEAU 7

POURCENTAGE DE FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES CHEZ LES 15 ANS ET PLUS, PAR SEXE, GROUPE D'ÂGE ET PROVINCE, CANADA, 1981

	FUMEURS RÉGULIERS EN POURCENTAGE DE POPULATION										
		PROVINCES									
	CANADA	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QUÉBEC	ONTARIO	MAN.	SASK.	ALBERTA	C.-B.
LES DEUX SEXES											
TOTAL											
TOUS ÂGES											
15 ANS ET PLUS.....	32.7%	33.7%	30.3%	34.2%	34.6%	39.0%	30.1%	29.4%	27.3%	32.7%	28.3%
15 - 19.....	23.1	20.3	*	25.2	27.0	32.1	18.9	22.5	16.4	22.8	16.5
20 - 24.....	40.4	44.7	35.7 Q	42.9	40.1	46.3	39.2	38.0	31.6	38.9	32.9
25 - 44.....	38.0	40.7	37.6	40.7	41.8	42.9	34.8	34.8	35.9	39.1	34.4
45 - 64.....	33.7	33.1	30.7	35.4	33.7	41.0	31.6	28.6	28.0	30.4	29.5
65 ANS ET PLUS.....	15.3	13.9	*	15.1	17.2	19.5	13.6	15.7	12.6	13.4	14.1
20 ANS ET PLUS.....	34.0	36.2	31.9	35.5	35.8	39.9	31.6	30.3	28.9	34.1	29.7
HOMMES											
TOUS ÂGES											
15 ANS ET PLUS.....	36.7	39.3	33.1	38.8	40.5	44.9	33.1	33.1	29.6	36.8	30.5
15 - 19.....	22.8	24.4	*	28.9	28.5	31.8	18.5	21.4	15.1	20.1	16.4
20 - 24.....	39.9	50.4	*	43.1	46.9	44.5	38.2	40.1	30.1	37.1	35.2
25 - 44.....	42.6	42.8	40.8	45.7	44.5	48.7	39.2	38.9	38.1	45.7	37.3
45 - 64.....	39.3	43.0	38.1 Q	39.8	42.3	51.4	35.0	32.1	32.0	35.7	32.1
65 ANS ET PLUS.....	21.3	24.8	*	22.1	30.1	29.9	17.5	23.1	17.5	19.3	14.9
20 ANS ET PLUS.....	38.7	42.1	35.3	40.3	42.4	46.7	35.2	34.7	31.7	39.2	32.4
FEMMES											
TOUS ÂGES											
15 ANS ET PLUS.....	28.9	28.0	27.6	29.9	29.0	33.4	27.2	25.8	25.0	28.6	26.1
15 - 19.....	23.4	16.1	*	21.4	25.5	32.4	19.4	23.6	17.7	25.5	16.6
20 - 24.....	40.8	38.6	48.1 Q	42.7	33.2	48.1	40.3	35.8	33.1	40.7	30.6
25 - 44.....	33.4	38.5	34.5 Q	35.8	39.1	37.2	30.6	30.7	33.7	32.2	31.6
45 - 64.....	28.5	22.7	23.5 Q	31.3	25.7	31.5	28.4	25.5	24.1	25.0	27.0
65 ANS ET PLUS.....	10.8	*	*	9.6	7.0	12.0	10.8	9.8	8.2	8.5	13.5
20 ANS ET PLUS.....	29.6	30.2	28.6	31.0	29.5	33.5	28.2	26.1	26.0	29.1	27.2

* Pourcentage basé sur une évaluation de population trop faible pour être représentative.

Q Forte variance de l'échantillonnage, utiliser avec précaution.

TABLEAU 8

RELATION ENTRE L'USAGE DU TABAC ET LE DEGRÉ D'INSTRUCTION
CANADA, 1981

SCOLARITÉ	RÉPARTITION EN POURCENTAGE DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS SELON LE NIVEAU D'INSTRUCTION	RÉPARTITION EN POURCENTAGE DES FUMEURS DE 15 ANS ET PLUS SELON LE NIVEAU D'INSTRUCTION
LES DEUX SEXES		
De 0 À 8 années d'études	21.4%	21.7%
Partie du secondaire mais pas de postsecondaire	52.0	57.8
Partie du postsecondaire	8.0	6.8
Diplôme postsecondaire	10.0	8.6
Diplôme universitaire	8.6	5.2
Pourcentage total	100.0	100.0
Population de base	(18,420,364)	(6,023,140)
HOMMES		
De 0 à 8 années d'études	22.0	25.0
Partie du secondaire mais pas de postsecondaire	49.8	53.7
Partie du postsecondaire	8.6	6.8
Diplôme postsecondaire	8.7	7.9
Diplôme universitaire	10.8	6.5
Pourcentage total	99.9	99.9
Population de base	(9,026,309)	(3,310,717)
FEMMES		
De 0 à 8 années d'études	20.9	17.6
Partie du secondaire mais pas de postsecondaire	54.0	62.8
Partie du postsecondaire	7.4	6.7
Diplôme postsecondaire	11.1	9.4
Diplôme universitaire	6.5	3.5
Pourcentage total	99.9	100.0
Population de base	(9,394,055)	(2,712,423)

Note: Le pourcentage total peut ne pas correspondre à 100, à cause d'une erreur d'arrondi.

TABLEAU 9

NOMBRE DE FUMEURS RÉGULIERS CHEZ LES 15 ANS ET PLUS, SELON LE SEXE, LA RÉGION GÉOGRAPHIQUE ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION, CANADA, 1981

	FUMEURS RÉGULIERS					
		INSTRUCTION				
	TOTAL	DE 0 À 8	PARTIE DU SECONDAIRE PAS DE POSTSECONDAIRE	PARTIE DU POST-SECONDAIRE	CERTIFICAT OU DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRE	DIPLÔME UNIVERSITAIRE
LES DEUX SEXES						
TOTAL						
CANADA						
TOTAL.....	6,023,140	1,306,571	3,480,637	407,345	517,280	311,307
RÉGION						
ATLANTIQUE.....	567,641	173,415	294,352	29,703	49,008	21,164
QUÉBEC.....	1,916,758	558,110	991,152	107,463	166,182	93,852
ONTARIO.....	2,000,916	374,874	1,215,170	135,914	160,811	114,147
PRAIRIES.....	947,854	142,558	591,634	68,728	90,735	54,199
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	589,970	57,615	388,328	65,537	50,544	27,946
HOMMES						
CANADA						
TOTAL.....	3,310,717	829,328	1,778,263	225,346	261,331	216,448
RÉGION						
ATLANTIQUE.....	321,752	114,218	154,833	16,031	23,293	13,376
QUÉBEC.....	1,074,626	338,828	514,695	57,375	94,426	69,302
ONTARIO.....	1,074,140	241,034	597,503	84,395	74,813	76,394
PRAIRIES.....	527,099	95,964	315,135	32,766	45,641	37,593
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	313,100	39,283	196,097	34,779	23,159	19,783
FEMMES						
CANADA						
TOTAL.....	2,712,423	477,243	1,702,374	181,998	255,949	94,859
RÉGION						
ATLANTIQUE.....	245,890	59,196	139,519	13,672	25,715	7,788
QUÉBEC.....	842,132	219,282	476,457	50,088	71,755	24,550
ONTARIO.....	926,777	133,840	617,667	51,519	85,999	37,752
PRAIRIES.....	420,755	46,594	276,500	35,961	45,095	16,606
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	276,870	18,332	192,231	30,759	27,385	8,163

Note: Pour connaître la population de base estimative, se reporter au tableau 11.

TABLEAU 10

POURCENTAGE DE FUMEURS RÉGULIERS CHEZ LES 15 ANS ET PLUS, SELON LE SEXE, LA RÉGION GÉOGRPAHIQUE ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION, CANADA, 1981

	FUMEURS RÉGULIERS EN POURCENTAGE DE POPULATION					
		INSTRUCTION				
	TOTAL	DE 0 À 8	PARTIE DU SECONDAIRE PAS DE POSTSECONDAIRE	PARTIE DU POST-SECONDAIRE	CERTIFICAT OU DIPLÔME POSTSECONDAIRE	DIPLÔME UNIVERSITAIRE
LES DEUX SEXES						
TOTAL						
CANADA						
TOTAL.....	32.7%	33.0%	36.4%	27.7%	28.2%	19.6%
RÉGIONS						
ATLANTIQUE.....	34.0	37.8	35.4	28.8	30.2	18.7
QUÉBEC.....	39.0	40.4	42.1	35.2	32.3	26.2
ONTARIO.....	30.1	28.5	34.9	23.7	25.0	17.9
PRAIRIES.....	30.6	26.3	35.0	27.4	28.0	18.9
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	28.3	22.3	32.0	27.5	26.6	14.8
HOMMES						
CANADA						
TOTAL.....	36.7	41.7	39.5	29.0	33.1	22.3
RÉGIONS						
ATLANTIQUE.....	39.1	44.9	39.1	32.7	40.5	20.6
QUÉBEC.....	44.9	52.8	46.5	34.6	37.7	30.2
ONTARIO.....	33.1	36.0	37.1	26.7	28.8	19.5
PRAIRIES.....	34.2	34.1	38.5	25.5	32.3	22.2
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	30.5	27.3	34.6	29.6	29.2	16.8
FEMMES						
CANADA						
TOTAL.....	28.9	24.3	33.5	26.3	24.5	15.5
RÉGIONS						
ATLANTIQUE.....	29.0	29.0	32.0	25.2	24.6	16.1
QUÉBEC.....	33.4	29.6	38.2	35.9	27.2	19.1
ONTARIO.....	27.2	20.7	33.0	20.1	22.4	15.3
PRAIRIES.....	27.1	17.9	31.8	29.5	24.7	14.1
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	26.1	16.0	29.8	25.6	24.7	11.5

NOTE: Pour connaître la population de base estimative, se reporter au tableau 11.

TABLEAU 11

RÉPARTITION ESTIMATIVE DES 15 ANS ET PLUS, SELON LE SEXE, LE GROUPE D'ÂGE ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION, CANADA, 1981

	TOTAL	INSTRUCTION				
		DE 0 À 8	PARTIE DU SECONDAIRE PAS DE POSTSECONDAIRE	PARTIE DU POST-SECONDAIRE	CERTIFICAT OU DIPLÔME POSTSECONDAIRE	DIPLÔME UNIVERSITAIRE
LES DEUX SEXES						
TOTAL						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS.....	18,420,364	3,956,826	9,573,320	1,469,336	1,834,599	1,586,283
15 - 19.....	2,205,006	198,657	1,781,536	187,011	36,858	*
20 - 24.....	2,329,183	115,734	1,377,603	377,400	320,678	137,767
25 - 44.....	7,081,466	902,480	3,620,877	605,793	958,755	993,560
45 - 64.....	4,568,408	1,604,862	2,005,922	214,404	378,924	364,296
65 ANS ET PLUS.....	2,236,302	1,135,093	787,382	84,728	139,383	89,716
20 ANS ET PLUS.....	16,215,358	3,758,168	7,791,784	1,282,326	1,797,741	1,585,339
HOMMES						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS.....	9,026,309	1,990,094	4,498,751	776,316	788,584	972,564
15 - 19.....	1,123,351	111,134	997,482	92,601	11,795	*
20 - 24.....	1,175,459	67,944	693,217	199,871	143,130	71,296
25 - 44.....	3,531,549	461,418	1,698,635	332,144	446,007	593,345
45 - 64.....	2,227,383	833,690	880,281	107,922	154,046	251,444
65 ANS ET PLUS.....	968,567	515,908	319,137	43,778	33,607	56,138
20 ANS ET PLUS.....	7,902,958	1,878,960	3,591,270	683,716	776,790	972,223
FEMMES						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS.....	9,394,055	1,966,732	5,074,569	693,020	1,046,015	613,720
15 - 19.....	1,081,655	87,524	874,054	94,410	25,063	*
20 - 24.....	1,153,724	47,790	684,386	177,529	177,548	66,471
25 - 44.....	3,549,917	441,062	1,922,242	273,649	512,749	400,214
45 - 64.....	2,341,025	771,172	1,125,641	106,481	224,878	112,853
65 ANS ET PLUS.....	1,267,735	619,184	468,246	40,950	105,776	33,578
20 ANS ET PLUS.....	8,312,400	1,879,208	4,200,514	598,610	1,020,952	613,116

Source: Suppléments de l'Enquête sur la population active, 1981.

* Estimation sujette à une trop grande variabilité de l'échantillonnage.

TABLEAU 12

NOMBRE DE FUMEURS RÉGULIERS DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, SELON LE SEXE, LE GROUPE D'ÂGE ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION, CANADA, 1981

	FUMEURS					
		INSTRUCTION				
	TOTAL	DE 0 À 8	PARTIE DU SECONDAIRE PAS DE POSTSECONDAIRE	PARTIE DU POST-SECONDAIRE	CERTIFICAT OU DIPLÔME POSTSECONDAIRE	DIPLÔME UNIVERSITAIRE
LES DEUX SEXES						
TOTAL						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS.....	6,023,140	1,306,571	3,480,637	407,345	517,280	311,307
15-19.....	509,005	63,074	402,812	35,400	7,719 Q	*
20-24.....	940,331	59,283	676,994	94,422	86,974	22,657
25-44.....	2,689,494	401,045	1,571,324	203,175	303,903	210,048
45-64.....	1,541,171	614,387	693,776	61,768	99,997	71,242
65 ANS ET PLUS.....	343,140	168,782	135,731	12,579	18,688	*
20 ANS ET PLUS.....	5,514,135	1,243,497	3,077,825	371,944	509,561	311,307
HOMMES						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS.....	3,310,717	829,328	1,778,263	225,346	261,331	216,448
15 - 19.....	255,979	34,219	205,790	14,802	*	*
20 - 24.....	469,320	37,394	339,524	46,203	33,801	12,396
25 - 44.....	1,504,207	242,773	820,402	125,489	167,233	148,310
45 - 64.....	875,016	396,065	343,779	31,175	52,790	51,208
65 ANS ET PLUS.....	206,195	118,876	68,768	7,677	6,341 Q	*
20 ANS ET PLUS.....	3,054,738	795,109	1,572,473	210,544	260,164	216,448
FEMMES						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS.....	2,712,423	477,243	1,702,374	181,998	255,949	94,859
15 - 19	253,026	28,854	197,022	20,598	6,552 Q	*
20 - 24.....	471,011	21,889	337,470	48,219	53,173	10,261
25 - 44.....	1,185,288	158,272	750,922	77,686	136,670	61,737
45 - 64.....	666,154	218,322	349,997	30,594	47,207	20,034
65 ANS ET PLUS.....	136,944	49,906	66,963	4,902	12,347	*
20 ANS ET PLUS.....	2,459,397	448,389	1,505,352	161,401	249,397	94,859

* - Estimation impossible à fournir en raison d'une extrême variabilité entre les échantillons.
Q - Estimation sujette à caution.

TABLEAU 13

POURCENTAGE DE FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, SELON LE SEXE LE GROUPE D'ÂGE ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION, CANADA, 1981

	POURCENTAGE DE FUMEURS PAR RAPPORT À LA POPULATION					
		INSTRUCTION				
	TOTAL	DE 0 À 8	PARTIE DU SECONDAIRE PAS DE POSTSECONDAIRE	PARTIE DU POST-SECONDAIRE	CERTIFICAT OU DIPLÔME POSTSECONDAIRE	DIPLÔME UNIVERSITAIRE
LES DEUX SEXES						
TOTAL						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS.....	32.7%	33.0%	36.4%	27.7%	28.2%	19.6%
15-19.....	23.1	31.8	22.6	18.9	20.9 Q	*
20-24.....	40.4	51.2	49.1	25.0	27.1	16.4
25-44.....	38.0	44.4	43.4	33.5	31.7	21.1
45-64.....	33.7	38.3	34.6	28.8	26.4	19.6
65 ANS ET PLUS.....	15.3	14.9	17.2	14.8	13.4	*
20 ANS ET PLUS.....	34.0	33.1	39.5	29.0	28.3	19.6
HOMMES						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS.....	36.7	41.7	39.5	29.0	33.1	22.3
15 - 19.....	22.8	30.8	22.7	16.0	*	*
20 - 24.....	39.9	55.0	49.0	23.1	23.6	17.4
25 - 44.....	42.6	52.6	48.3	37.8	37.5	25.0
45 - 64.....	39.3	47.5	39.1	28.9	34.3	20.4
65 ANS ET PLUS.....	21.3	23.0	21.5	17.5	18.9 Q	*
20 ANS ET PLUS.....	38.7	42.3	43.8	30.8	33.5	22.3
FEMMES						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS.....	28.9	24.3	33.5	26.3	24.5	15.5
15 - 19	23.4	33.0	22.5	21.8	26.1 Q	*
20 - 24.....	40.8	45.8	49.3	27.2	29.9	15.4
25 - 44.....	33.4	35.9	39.1	28.4	26.7	15.4
45 - 64.....	28.5	28.3	31.1	28.7	21.0	17.8
65 ANS ET PLUS.....	10.8	8.1	14.3	12.0	11.7	*
20 ANS ET PLUS.....	29.6	23.9	35.8	27.0	24.4	15.5

* - Pourcentage basé sur une estimation de population trop faible pour être représentative.
Q - Forte variance de l'échantillonnage, utiliser avec précaution.

TABLEAU 14

CHIFFRES DE POPULATION ET NOMBRE DE FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, SELON LE SEXE, LE GROUPE D'ÂGE ET LA RÉGION, CANADA, 1981

	CANADA	RÉGION				
	TOTAL	ATLANTIQUE	QUÉBEC	ONTARIO	PRAIRIES	COLOMBIE-BRITANNIQUE
LES DEUX SEXES						
TOTAL						
GROUPE D'ÂGE						
TOTAL (15 ANS ET PLUS)						
POPULATION	18,420,364	1,669,715	4,914,970	6,655,517	3,092,518	2,087,644
NOMBRE DE FUMEURS	6,023,140	567,641	1,916,758	2,000,916	947,854	589,970
15 - 19 ANS						
POPULATION	2,205,006	227,871	587,185	785,164	375,935	228,853
NOMBRE DE FUMEURS	509,005	54,945	188,298	148,451	79,638	37,673
20 - 24 ANS						
POPULATION	2,329,183	221,893	628,634	818,920	415,141	244,595
NOMBRE DE FUMEURS	940,331	93,475	291,098	321,239	154,097	80,422
25 - 44 ANS						
POPULATION	7,081,466	628,834	1,936,509	2,518,327	1,199,091	798,705
NOMBRE DE FUMEURS	2,689,494	257,128	830,978	877,287	448,959	275,142
45 - 64 ANS						
POPULATION	4,568,408	377,679	1,218,908	1,716,153	726,168	529,499
NOMBRE DE FUMEURS	1,541,171	128,660	500,358	542,673	213,067	156,413
65 ANS ET PLUS						
POPULATION	2,236,302	213,439	543,735	816,953	376,184	285,993
NOMBRE DE FUMEURS	343,140	33,433	106,027	111,267	52,094	40,320
20 ET PLUS						
POPULATION	16,215,358	1,441,845	4,327,785	5,870,354	2,716,584	1,858,791
NOMBRE DE FUMEURS	5,514,135	512,696	1,728,460	1,852,465	868,217	552,297
HOMMES						
GROUPE D'ÂGE						
TOTAL (15 ANS ET PLUS)						
POPULATION	9,026,309	822,203	2,394,637	3,245,401	1,538,993	1,025,075
NOMBRE DE FUMEURS	3,310,717	321,752	1,074,626	1,074,140	527,099	313,100
15 - 19 ANS						
POPULATION	1,123,351	115,721	299,180	401,021	190,876	116,554
NOMBRE DE FUMEURS	255,979	31,215	95,029	74,015	36,633	19,085
20 - 24 ANS						
POPULATION	1,175,459	112,137	317,093	414,271	209,924	122,035
NOMBRE DE FUMEURS	469,320	50,724	141,255	158,358	76,055	42,928
25 - 44 ANS						
POPULATION	3,531,549	314,142	965,270	1,246,279	607,286	398,571
NOMBRE DE FUMEURS	1,504,207	139,285	469,748	488,095	258,556	148,523
45 - 64 ANS						
POPULATION	2,227,383	184,650	584,569	838,414	359,739	260,012
NOMBRE DE FUMEURS	875,016	76,152	300,253	293,225	121,822	83,564
65 ANS ET PLUS						
POPULATION	968,567	95,553	228,526	345,416	171,169	127,904
NOMBRE DE FUMEURS	206,195	24,375	68,341	60,446	34,033	19,000 Q
20 ANS ET PLUS						
POPULATION	7,902,958	706,482	2,095,457	2,844,380	1,348,117	908,521
NOMBRE DE FUMEURS	3,054,738	290,536	979,597	1,000,124	490,466	294,015
FEMMES						
GROUPE D'ÂGE						
TOTAL (15 ANS ET PLUS)						
POPULATION	9,394,055	847,513	2,520,332	3,410,116	1,553,525	1,062,569
NOMBRE DE FUMEURS	2,712,423	245,890	842,132	926,777	420,755	276,870
15 - 19 ANS						
POPULATION	1,081,655	112,150	288,005	384,143	185,059	112,299
NOMBRE DE FUMEURS	253,026	23,720	93,268	74,436	43,004	18,588 Q
20 - 24 ANS						
POPULATION	1,153,724	109,756	311,541	404,650	205,218	122,560
NOMBRE DE FUMEURS	471,011	42,752	149,843	162,881	78,042	37,494
25 - 44 ANS						
POPULATION	3,549,917	314,691	971,238	1,272,048	591,804	400,135
NOMBRE DE FUMEURS	1,185,288	117,843	361,230	389,192	190,403	126,620
45 - 64 ANS						
POPULATION	2,341,025	193,030	634,340	877,739	366,429	269,487
NOMBRE DE FUMEURS	666,154	52,508	200,105	249,448	91,245	72,849
65 ANS ET PLUS						
POPULATION	1,267,735	117,886	315,209	471,537	205,015	158,089
NOMBRE DE FUMEURS	136,944	9,057 Q	37,686	50,821	18,061	21,320
20 ANS ET PLUS						
POPULATION	8,312,400	735,363	2,232,327	3,025,974	1,368,466	950,270
NOMBRE DE FUMEURS						

Q Forte variance d'échantillonnage, utiliser avec précaution.

TABLEAU 15

POURCENTAGE DE FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, SELON LE SEXE, LE GROUPE D'ÂGE ET LA RÉGION, CANADA, 1981

	POURCENTAGE DE FUMEURS PAR RAPPORT À LA POPULATION					
	CANADA	RÉGIONS				
	TOTAL	ATLANTIQUE	QUÉBEC	ONTARIO	PRAIRIES	COLOMBIE-BRITANNIQUE
LES DEUX SEXES						
TOTAL						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS.....	32.7%	34.0%	39.0%	30.1%	30.6%	28.3%
15 - 19.....	23.1	24.1	32.1	18.9	21.2	16.5
20 - 24.....	40.4	42.1	46.3	39.2	37.1	32.9
25 - 44.....	38.0	40.9	42.9	34.8	37.4	34.4
45 - 64.....	33.7	34.1	41.0	31.6	29.3	29.5
65 ANS ET PLUS.....	15.3	15.7	19.5	13.6	13.8	14.1
20 ANS ET PLUS.....	34.0	35.6	39.9	31.6	32.0	29.7
HOMMES						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS.....	36.7	39.1	44.9	33.1	34.2	30.5
15 - 19.....	22.8	27.0	31.8	18.5	19.2	16.4
20 - 24.....	39.9	45.2	44.5	38.2	36.2	35.2
25 - 44.....	42.6	44.3	48.7	39.2	42.6	37.3
45 - 64.....	39.3	41.2	51.4	35.0	33.9	32.1
65 ANS ET PLUS.....	21.3	25.5	29.9	17.5	19.9	14.9 Q
20 ANS ET PLUS.....	38.7	41.1	46.7	35.2	36.4	32.4
FEMMES						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS.....	28.9	29.0	33.4	27.2	27.1	26.1
15 - 19.....	23.4	21.2	32.4	19.4	23.2	16.6
20 - 24.....	40.8	39.0	48.1	40.3	38.0	30.6
25 - 44.....	33.4	37.4	37.2	30.6	32.2	31.6
45 - 64.....	28.5	27.2	31.5	28.4	24.9	27.0
65 ANS ET PLUS.....	10.8	7.7 Q	12.0	10.8	8.8 Q	*
20 ANS ET PLUS.....	29.6	30.2	33.5	28.2	27.6	27.2

Q Forte variance d'échantillonnage, utiliser avec précaution.
* Pourcentage basé sur une population trop réduite pour être représentative.

TABLEAU 16

POURCENTAGE DE FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, SELON LE SEXE ET LA CATÉGORIE D'OCCUPATION, CANADA, 1977-1981

CATÉGORIE	HOMMES			FEMMES		
	1977	1979	1981	1977	1979	1981
DIRECTION	36.1%	33.7%	31.9%	38.8%	35.8%	33.3%
PROFESSIONS	28.5	27.9	24.9	28.6	26.1	23.5
EMPLOIS DE BUREAU	39.5	39.6	34.5	39.1	36.2	33.3
VENTES	44.1	37.7	36.3	34.1	32.1	31.3
SERVICES	44.7	38.1	38.4	36.0	37.6	36.4
PLEIN AIR	35.4	35.3	30.8	25.3Q	21.6	22.4
MINES	54.2Q	51.3Q	49.5	*	*	*
INDUSTRIES DE PRODUCTION	48.6	46.5	44.0	36.7	37.3	34.8
CONSTRUCTION	47.9	45.7	45.8	*	*	*
TRANSPORTS	51.8	48.0	45.8	43.7Q	42.1	41.6
AUTRES	47.1	43.8	42.3	*	*	48.4
SANS EMPLOI	25.6	25.1	26.1	23.7	22.1	22.0
TOTAL	40.8	38.6	36.7	31.1	30.1	28.9

Toutes les catégories incluent les personnes qui: 1 - travaillent, 2 - ne travaillent pas mais dont le dernier emploi était dans la catégorie nommée, 3 - ne sont plus dans la population active mais occupaient un emploi dans la catégorie nommée.

"Professions" comprend les groupes suivants de l'Enquête sur la population active (EPA): sciences naturelles, sciences sociales, religion, enseignement, médecine, arts.

"Plein air" comprend les groupes suivants de l'EPA: agriculture, pêches et exploitation des forêts.

"Industries de production" comprend les groupes suivants de l'EPA: groupes reliés à la préparation, l'usinage et la fabrication des produits.

"Transports" comprend les groupes suivants de l'EPA: groupes reliés au transport et à la manutention des biens.

"Sans emploi" comprend les groupes suivants de l'EPA: n'ont jamais travaillé, travaillaient il y a plus de cinq ans, en état d'incapacité permanente de travailler.

TABLEAU 17

RÉPARTITION EN POURCENTAGE DES FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, D'APRÈS LE NOMBRE DE CIGARETTES FUMÉES PAR JOUR, CANADA, 1981

NOMBRE DE CIGARETTES FUMÉES PAR JOUR	HOMMES	FEMMES	LES DEUX SEXES
1-5	4.3%	5.2%	4.7%
6-10	13.3	17.0	15.0
11-15	13.9	17.8	15.7
16-20	25.2	24.1	24.7
21-25	28.2	26.6	27.5
26-30	4.7	3.2	4.0
31-35	1.8	1.4	1.6
36-40	4.6	2.5	3.7
PLUS DE 40	4.0	2.2	3.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0
POPULATION DE BASE	3,310,717	2,712,423	6,023,140

TABLEAU 18

RÉPARTITION EN POURCENTAGE DES FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, SELON LE SEXE ET SELON LA QUANTITÉ DE CIGARETTES FUMÉES PAR JOUR, CANADA, 1970 ET 1981

	ANNÉE DE L'ENQUÊTE		TAUX DE VARIATION 1970-1981	
	1970	1981	ABSOLU	RELATIF
HOMMES				
1-10 PAR JOUR	20.3%	17.6%	-2.7%	-13.3%
11-25 PAR JOUR	67.5	67.3	-0.2	-0.3
PLUS DE 25 PAR JOUR	12.2	15.1	+2.9	+23.8
TOTAL	100.0	100.0		
FEMMES				
1-10 PAR JOUR	31.2	22.3	-8.9	-28.5
11-25 PAR JOUR	63.2	68.5	+5.9	+8.5
PLUS DE 25 PAR JOUR	5.6	9.2	+3.6	+64.3
TOTAL	100.0	100.0		
LES DEUX SEXES				
1-10 PAR JOUR	24.6	19.7	-4.9	-19.9
11-25 PAR JOUR	65.8	67.8	+2.0	+3.0
PLUS DE 25 JOUR	9.6	12.5	+2.9	+30.2
TOTAL	100.0	100.0		

TABLEAU 19

CHIFFRES DE POPULATION ET NOMBRE DE FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, SELON LE SEXE, LA RÉGION GÉOGRAPHIQUE ET LA QUANTITÉ DE CIGARETTES FUMÉES PAR JOUR, CANADA, 1981

	LES DEUX SEXES	SEXE	
	TOTAL	HOMMES	FEMMES
CANADA			
DANS L'ENSEMBLE			
POPULATION	18,420,364	9,026,309	9,394,055
NOMBRE DE FUMEURS	6,023,140	3,310,717	2,712,423
1 À 10 CIGARETTES	1,187,588	583,858	603,731
11 À 25 CIGARETTES	4,085,672	2,227,524	1,858,148
PLUS DE 25 CIGARETTES	749,880	499,335	250,545
RÉGIONS			
ATLANTIQUE			
POPULATION	1,669,715	822,203	847,513
NOMBRE DE FUMEURS	567,641	321,752	245,890
1 À 10 CIGARETTES	111,529	52,983	58,546
11 À 25 CIGARETTES	386,581	221,013	165,568
PLUS DE 25 CIGARETTES	69,531	47,756	21,776
QUÉBEC			
POPULATION	4,914,970	2,394,637	2,520,332
NOMBRE DE FUMEURS	1,916,758	1,074,626	842,132
1 À 10 CIGARETTES	389,310	190,928	198,382
11 À 25 CIGARETTES	1,270,828	708,351	562,477
PLUS DE 25 CIGARETTES	256,620	175,347	81,272
ONTARIO			
POPULATION	6,655,517	3,245,401	3,410,116
NOMBRE DE FUMEURS	2,000,916	1,074,140	926,777
1 À 10 CIGARETTES	410,786	210,397	200,389
11 À 25 CIGARETTES	1,356,257	709,598	646,659
PLUS DE 25 CIGARETTES	233,873	154,145	79,728
PRAIRIES			
POPULATION	3,092,518	1,538,993	1,553,525
NOMBRE DE FUMEURS	947,854	527,099	420,755
1 À 10 CIGARETTES	159,502	77,566	81,936
11 À 25 CIGARETTES	690,052	382,060	307,993
PLUS DE 25 CIGARETTES	98,300	67,473	30,827
COLOMBIE-BRITANNIQUE			
POPULATION	2,087,644	1,025,075	1,062,569
NOMBRE DE FUMEURS	589,970	313,100	276,870
1 À 10 CIGARETTES	116,461	51,983	64,478
11 À 25 CIGARETTES	381,953	206,503	175,450
PLUS DE 25 CIGARETTES	91,556	54,614	36,942

TABLEAU 20

RÉPARTITION PROPORTIONNELLE ESTIMATIVE DES FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES DE 15 ANS ET PLUS, SELON LE SEXE, LA RÉGION GÉOGRAPHIQUE ET LA QUANTITÉ DE CIGARETTES FUMÉES PAR JOUR, CANADA, 1981

		TOTAL POUR LES DEUX SEXES	HOMMES	FEMMES
CANADA	TOTAL DES FUMEURS	6,023,140	3,310,717	2,712,423
	1 À CIGARETTES	19.7%	17.6%	22.3%
	11 À 25 CIGARETTES	67.8	67.3	68.5
	PLUS DE 25 CIGARETTES	12.5	15.1	9.2
	POURCENTAGE TOTAL	100.0	100.0	100.0
ATLANTIQUE	TOTAL DES FUMEURS	567,641	321,752	245,890
	1 À 10 CIGARETTES	19.6	16.5	23.8
	11 À 25 CIGARETTES	68.1	68.7	67.3
	PLUS DE 25 CIGARETTES	12.3	14.8	8.9
	POURCENTAGE TOTAL	100.0	100.0	100.0
QUÉBEC	TOTAL DES FUMEURS	1,916,758	1,074,626	842,132
	1 À 10 CIGARETTES	20.3	17.8	23.6
	11 À 25 CIGARETTES	66.3	65.9	66.7
	PLUS DE 25 CIGARETTES	13.4	16.3	9.7
	POURCENTAGE TOTAL	100.0	100.0	100.0
ONTARIO	TOTAL DE FUMEURS	2,000,916	1,074,140	926,777
	1 À 10 CIGARETTES	20.5	19.6	21.6
	11 À 25 CIGARETTES	67.8	66.1	69.8
	PLUS DE 25 CIGARETTES	11.7	14.3	8.6
	POURCENTAGE TOTAL	100.0	100.0	100.0
PRAIRIES	TOTAL DES FUMEURS	947,854	527,099	420,755
	1 À 10 CIGARETTES	16.8	14.7	19.5
	11 À 25 CIGARETTES	72.8	72.5	73.2
	PLUS DE 25 CIGARETTES	10.4	12.8	7.3
	POURCENTAGE TOTAL	100.0	100.0	100.0
COLOMBIE-BRITANNIQUE	TOTAL DES FUMEURS	589,970	313,100	276,870
	1 À 10 CIGARETTES	19.7	16.6	23.3
	11 À 25 CIGARETTES	64.8	66.0	63.4
	PLUS DE 25 CIGARETTES	15.5	17.4	13.3
	POURCENTAGE TOTAL	100.0	100.0	100.0

TABLEAU 21

RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES DES DEUX SEXES, SELON LA QUANTITÉ DE CIGARETTES FUMÉES PAR JOUR, LE GROUPE D'ÂGE ET LA RÉGION GÉOGRAPHIQUE, CANADA, 1981

	CANADA	RÉGIONS				
	TOTAL	ATLANTIQUE	QUÉBEC	ONTARIO	PRAIRIES	COLOMBIE-BRITANNIQUE
LES DEUX SEXES						
TOTAL						
GROUPE D'ÂGE						
TOTAL (15 ANS ET PLUS)						
ENSEMBLE DES FUMEURS.....	6,023,140	567,641	1,916,758	2,000,916	947,854	589,970
1 À 10 CIGARETTES.....	19.7	19.6	20.3	20.5	16.8	19.7
11 À 25 CIGARETTES.....	67.8	68.1	66.3	67.8	72.8	64.7
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	12.5	12.3	13.4	11.7	10.4	15.6
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
15 - 19 ANS						
TOTAL DES FUMEURS.....	509,005	54,945	188,298	148,451	79,638	37,673
1 À 10 CIGARETTES.....	37.8	37.7	37.2	40.0	28.9	50.8
11 À 25 CIGARETTES.....	59.5	60.0	59.4	58.6	67.6	46.3
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	2.7	2.3	3.4	1.4	3.5	2.9
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
20 - 24 ANS						
TOTAL DES FUMEURS.....	940,331	93,475	291,098	321,239	154,097	80,422
1 À 10 CIGARETTES.....	20.7	23.7	24.3	18.3	20.5	13.8
11 À 25 CIGARETTES.....	72.4	68.6	68.7	75.6	75.0	73.0
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	6.9	7.7	7.0	6.1	4.5	13.2
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
25 - 44 ANS						
TOTAL DES FUMEURS.....	2,689,494	257,128	830,978	877,287	448,959	275,142
1 À 10 CIGARETTES.....	15.7	15.0	15.4	17.4	12.3	17.7
11 À 25 CIGARETTES.....	69.3	70.2	68.5	68.6	75.0	63.1
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	15.0	14.8	16.1	14.0	12.7	19.2
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
45 - 64 ANS						
TOTAL DES FUMEURS.....	1,541,171	128,660	500,358	542,673	213,067	156,413
1 À 10 CIGARETTES.....	17.3	16.0	17.7	17.5	17.5	16.2
11 À 25 CIGARETTES.....	66.8	67.8	64.8	67.1	69.5	67.7
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	15.9	16.1	17.5	15.4	13.0	16.1
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
65 ANS ET PLUS						
TOTAL DES FUMEURS.....	343,140	33,433	106,027	111,267	52,094	40,320
1 À 10 CIGARETTES.....	32.4	28.2	30.0	40.6	23.6	30.5
11 À 25 CIGARETTES.....	60.9	64.7	61.6	54.0	68.3	65.5
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	6.7	7.1	8.4	5.4	8.1	4.0
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
TOTAL						
GROUPE D'ÂGE						
20 ANS ET PLUS						
TOTAL DES FUMEURS.....	5,514,135	512,696	1,728,460	1,852,465	868,217	552,297
1 À 10 CIGARETTES.....	18.0	17.7	18.5	19.0	15.7	17.6
11 À 25 CIGARETTES.....	68.6	69.0	67.0	68.5	73.3	66.0
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	13.4	13.3	14.5	12.5	11.0	16.4
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

TABLEAU 22

RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES CHEZ LES HOMMES, SELON LA QUANTITÉ DE CIGARETTES FUMÉES PAR JOUR, LE GROUPE D'ÂGE ET LA RÉGION GÉOGRAPHIQUE, CANADA, 1981

	CANADA	RÉGIONS				
	TOTAL	ATLANTIQUE	QUÉBEC	ONTARIO	PRAIRIES	COLOMBIE-BRITANNIQUE
HOMMES						
TOTAL						
GROUPE D'ÂGE						
TOTAL (15 ANS ET PLUS)						
ENSEMBLE DE FUMEURS.....	3,310,717	321,752	1,074,626	1,074,140	527,099	313,100
1 À 10 CIGARETTES.....	17.6	16.5	17.8	19.6	14.7	16.6
11 À 25 CIGARETTES.....	67.3	68.7	65.9	66.1	72.5	66.0
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	15.1	14.8	16.3	14.3	12.8	17.4
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
15 - 19 ANS						
TOTAL DES FUMEURS.....	255,979	31,215	95,029	74,015	36,633	19,085
1 À 10 CIGARETTES.....	40.4	32.3	41.1	45.1	28.8	54.4
11 À 25 CIGARETTES.....	56.1	64.7	55.0	52.0	67.3	41.6
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	3.5	3.0	3.9	2.9	3.9	4.0
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
20 - 24 ANS						
TOTAL DES FUMEURS.....	469,320	50,724	141,255	158,358	76,055	42,928
1 À 10 CIGARETTES.....	19.9	20.8	22.9	19.1	18.9	13.6
11 À 25 CIGARETTES.....	72.8	70.3	70.0	75.4	75.5	71.3
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	7.3	8.9	7.1	5.5	5.6	15.1
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
25 - 44 ANS						
TOTAL DES FUMEURS.....	1,504,207	139,285	469,748	488,095	258,556	148,523
1 À 10 CIGARETTES.....	13.5	12.5	12.8	15.7	10.7	14.3
11 À 25 CIGARETTES.....	68.6	69.3	67.6	67.8	74.1	63.7
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	17.9	18.2	19.6	16.5	15.2	22.0
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
45 - 64 ANS						
TOTAL DES FUMEURS.....	875,016	76,152	300,253	293,225	121,822	83,564
1 À 10 CIGARETTES.....	15.0	11.3	14.8	17.0	15.5	11.4
11 À 25 CIGARETTES.....	65.6	68.3	63.9	63.3	68.8	72.9
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	19.4	20.4	21.3	19.7	15.7	15.7
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
65 ANS ET PLUS						
TOTAL DES FUMEURS.....	206,195	24,375	68,341	60,446	34,033	19,000
1 À 10 CIGARETTES.....	25.6	25.9	21.7	33.7	18.3	26.2
11 À 25 CIGARETTES.....	66.0	67.9	69.9	57.7	72.2	65.4
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	8.4	6.2	8.4	8.6	9.5	8.4
TOTAL PERCENT.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
20 ANS ET PLUS						
TOTAL DES FUMEURS.....	3,054,738	290,536	979,597	1,000,124	490,466	294,015
1 À 10 CIGARETTES.....	15.7	14.8	15.5	17.7	13.7	14.2
11 À 25 CIGARETTES.....	68.2	69.1	67.0	67.1	72.9	67.5
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	16.1	16.1	17.5	15.2	13.4	18.3
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

TABLEAU 23

RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES CHEZ LES FEMMES, SELON LA QUANTITÉ DE CIGARETTES FUMÉES PAR JOUR, LE GROUPE D'ÂGE ET LA RÉGION GÉOGRAPHIQUE, CANADA, 1981

	CANADA	RÉGIONS				
	TOTAL	ATLANTIQUE	QUÉBEC	ONTARIO	PRAIRIES	COLOMBIE-BRITANNIQUE
FEMMES						
TOTAL						
GROUPE D'ÂGE						
TOTAL (15 ANS ET PLUS)						
ENSEMBLE DES FUMEURS.....	2,712,423	245,890	842,132	926,777	420,755	276,870
1 À 10 CIGARETTES.....	22.3	23.8	23.6	21.6	19.5	23.3
11 À 25 CIGARETTES.....	68.5	67.3	66.8	69.8	73.2	63.4
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	9.2	8.9	9.6	8.6	7.3	13.3
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
15 - 19 ANS						
TOTAL DES FUMEURS.....	253,026	23,730	93,268	74,436	43,004	18,588
1 À 10 CIGARETTES.....	35.1	44.8	33.2	34.9	29.0	47.2
11 À 25 CIGARETTES.....	63.0	53.7	63.9	65.1	67.8	51.2
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	1.9	1.5	2.9	.0	3.2	*
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
20 - 24 ANS						
TOTAL DES FUMEURS.....	471,011	42,752	149,843	162,881	78,042	37,494
1 À 10 CIGARETTES.....	21.4	27.1	25.6	17.6	22.1	14.0
11 À 25 CIGARETTES.....	72.0	66.7	67.4	75.8	74.5	75.0
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	6.6	6.2	7.0	6.6	3.4	11.0
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
25 - 44 ANS						
TOTAL DES FUMEURS.....	1,185,288	117,843	361,230	389,192	190,403	126,620
1 À 10 CIGARETTES.....	18.5	17.9	18.7	19.5	14.5	21.6
11 À 25 CIGARETTES.....	70.1	71.3	69.7	69.7	76.3	62.4
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	11.4	10.8	11.6	10.8	9.2	16.0
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
45 - 64 ANS						
TOTAL DES FUMEURS.....	66,154	52,508	200,105	249,448	91,245	72,849
1 À 10 CIGARETTES.....	20.4	23.0	22.1	18.2	20.3	21.7
11 À 25 CIGARETTES.....	68.3	67.1	66.1	71.5	70.6	61.6
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	11.3	9.9	11.8	10.3	9.1	16.7
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
65 ANS ET PLUS						
TOTAL DES FUMEURS.....	136,944	9,057	37,686	50,821	18,061	21,320
1 À 10 CIGARETTES.....	42.6	34.4	45.3	48.7	33.7	34.4
11 À 25 CIGARETTES.....	53.2	55.9	46.7	49.6	60.9	65.6
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	4.2	9.7 Q	8.0	1.7	5.4	0.0
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
20 ANS ET PLUS						
TOTAL DES FUMEURS.....	2,459,397	222,160	748,863	852,341	377,751	258,282
1 À 10 CIGARETTES.....	20.9	21.6	22.4	20.5	18.4	21.6
11 À 25 CIGARETTES.....	69.1	68.8	67.1	70.2	73.8	64.2
PLUS DE 25 CIGARETTES.....	10.0	9.6	10.5	9.3	7.8	14.2
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Q Forte variance d'échantillonnage, utiliser avec précaution.
* Pourcentage basé sur une population trop réduite pour être représentative.

TABLEAU 24

RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES CHEZ LES 15 ANS ET PLUS, SELON LE SEXE, LA QUANTITÉ DE CIGARETTES FUMÉES PAR JOUR ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION, CANADA, 1981

QUANTITÉ DE CIGARETTES FUMÉES PAR JOUR	TOTAL	INSTRUCTION				
		DE 0 À 8	PARTIE DU SECONDAIRE, PAS DE POSTSECONDAIRE	COURS SECONDAIRE, PARTIE DU POSTSECONDAIRE	CERTIFICAT OU DIPLÔME POSTSECONDAIRE	DIPLÔME UNIVERSITAIRE
LES DEUX SEXES						
TOTAL DES FUMEURS.....	6,023,140	1,306,571	3,480,637	407,345	517,280	311,307
1 À 10.....	19.7%	21.5%	19.1%	20.1%	18.1%	20.7%
11 À 25.....	67.8	63.1	69.4	68.5	71.3	63.7
PLUS DE 25.....	12.5	15.4	11.5	11.4	10.6	15.6
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
HOMMES						
TOTAL DES FUMEURS.....	3,310,717	829,328	1,778,263	225,346	261,331	216,448
1 À 10.....	17.6	18.8	17.6	16.5	15.9	16.2
11 À 25.....	67.3	62.3	69.1	68.6	70.1	66.7
PLUS DE 25.....	15.1	18.9	13.3	14.9	14.0	17.1
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
FEMMES						
TOTAL DES FUMEUSES.....	2,712,423	477,243	1,702,374	181,998	255,949	94,859
1 À 10.....	22.3	26.2	20.7	24.5	20.3	30.9
11 À 25.....	68.5	64.7	69.6	68.3	72.6	56.6
PLUS DE 25.....	9.2	9.1	9.7	7.2	7.1	12.4
POURCENTAGE TOTAL.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

TABLEAU 25

RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES SELON LA TENEUR EN GOUDRON DE LA MARQUE QUE L'ON FUME COURAMMENT, LE SEXE ET LE GROUPE D'ÂGE, CANADA, 1981

SEXE ET GROUPE D'ÂGE	TOTAL DES FUMEURS	TENEUR EN GOUDRON DE LA MARQUE DE CONSOMMATION COURANTE					
		FAIBLE TENEUR (0-9 MG)	TENEUR MOYENNE (10-15 MG)	FORTE TENEUR (16 MG ET PLUS)	CIGARETTES ROULÉES À LA MAIN	AUTRES	NE SAVENT PAS
TOTAL DEUX SEXES							
GROUPE D'ÂGE							
TOTAL TOUS ÂGES	6,023,140	1,132,447	2,478,349	1,930,646	388,176	56,078	37,444 Q
POURCENTAGE	100.0	18.8	41.1	32.1	6.4	.9	*
15-19 ANS	509,005	57,837	250,265	171,666	22,938 Q	*	*
POURCENTAGE	100.0	11.4	49.2	33.7	4.5	*	*
20-24 ANS	940,331	139,668	470,732	295,806	21,895 Q	*	*
POURCENTAGE	100.0	14.9	50.1	31.5	2.3 Q	*	*
25-34 ANS	1,609,559	308,729	710,260	514,183	54,211	*	*
POURCENTAGE	100.0	19.2	44.1	31.9	3.4	*	*
35-44 ANS	1,079,936	222,949	427,900	359,748	52,162	*	*
POURCENTAGE	100.0	20.6	39.6	33.3	4.8	*	*
45-54 ANS	908,725	195,511	307,625	302,174	87,863	*	*
POURCENTAGE	100.0	21.5	33.9	33.3	9.7	*	*
55-64 ANS	632,445	117,035	211,112	197,114	94,335	*	*
POURCENTAGE	100.0	18.5	33.4	31.2	14.9	*	*
65 ET PLUS	343,140	90,718	100,455	89,955	54,772	*	*
POURCENTAGE	100.0	26.4	29.3	26.2	16.0		
HOMMES							
GROUPE D'ÂGE							
TOTAL TOUS ÂGES	3,310,717	474,153	1,327,779	1,187,390	263,084	36,019	22,292 Q
POURCENTAGE	100.0	14.3	40.1	35.9	7.9	*	*
15-19 ANS	255,979	16,351	117,887	99,815	* Q	*	*
POURCENTAGE	100.0	6.4	46.1	39.0	*	*	*
20-24 ANS	469,320	48,985	238,863	160,234	*	*	*
POURCENTAGE	100.0	10.4	50.9	34.1	*	*	*
25-34 ANS	886,847	136,297	393,230	313,304	29,438	*	*
POURCENTAGE	100.0	15.4	44.3	35.3	3.3	*	*
35-44 ANS	617,360	103,175	237,388	235,718	33,114	*	*
POURCENTAGE	100.0	16.7	38.5	38.2	5.4	*	*
45-54 ANS	510,024	81,219	173,624	186,253	58,066	*	*
POURCENTAGE	100.0	15.9	34.0	36.5	11.4	*	*
55-64 ANS	364,993	46,753	111,757	131,429	67,883	*	*
POURCENTAGE	100.0	12.8	30.6	36.0	18.6	*	*
65 ET PLUS	206,195	41,391	55,030	60,637	43,090	*	*
POURCENTAGE	100.0	20.1	26.7	29.4	20.9		
FEMMES							
GROUPE D'ÂGE							
TOTAL TOUS ÂGES	2,712,423	658,294	1,150,570	743,256	125,092	20,059 Q	15,152
POURCENTAGE	100.0	24.3	42.4	27.4	4.6	*	*
15-19 ANS	253,026	41,486	132,378	71,851	*	*	*
POURCENTAGE	100.0	16.4	52.3	28.4	*	*	*
20-24 ANS	471,011	90,683	231,869	135,572	*	*	*
POURCENTAGE	100.0	19.3	49.2	28.8	*	*	*
25-34 ANS	722,712	172,432	317,029	200,880	24,774 Q	*	*
POURCENTAGE	100.0	23.9	43.9	27.8	3.4 Q	*	*
35-44 ANS	462,576	119,774	190,512	124,030	19,048 Q	*	*
POURCENTAGE	100.0	25.9	41.2	26.8	4.1 Q	*	*
45-54 ANS	398,702	114,292	134,001	115,921	29,797	*	*
POURCENTAGE	100.0	28.7	33.6	29.1	7.5	*	*
55-64 ANS	267,452	70,300	99,355	65,685	26,452	*	*
POURCENTAGE	100.0	26.3	37.1	24.6	9.9	*	*
65 ET PLUS	136,944	49,327	45,425	29,317	*	*	*
POURCENTAGE	100.0	36.0	33.2	21.4			

* Estimation impossible à fournir en raison d'une extrême variabilité entre les échantillons.
Q Forte variance d'échantillonnage, utiliser avec précaution.

TABLEAU 26

RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES ÂGÉS DE 15 ANS ET PLUS DES DEUX SEXES, SELON LA TENEUR EN GOUDRON DE LA MARQUE QUE L'ON FUME COURAMMENT ET LA RÉGION, CANADA, 1981

		TENEUR EN GOUDRON DE LA MARQUE DE CONSOMMATION COURANTE					
	TOTAL DES FUMEURS	FAIBLE TENEUR (0-9 MG)	TENEUR MOYENNE (10-15 MG)	FORTE TENEUR (16 MG ET PLUS)	CIGARETTES ROULÉES À LA MAIN	AUTRES	NE SAVENT PAS
LES DEUX SEXES							
CANADA	6,023,140	18.8%	41.1%	32.1%	6.4%	*	*
ATLANTIQUE	567,641	13.4	42.0	35.2	8.[illegible]	*	*
QUÉBEC	1,916,758	15.0	36.5	36.5	10.7	*	*
ONTARIO	2,000,916	21.5	45.6	27.7	3.5	*	*
PRAIRIES	947,854	21.3	40.3	32.9	3.9	*	*
COLOMBIE-BRITANNIQUE	589,970	23.2	41.8	28.0	5.1	*	*
HOMMES							
CANADA	3,310,717	14.3%	40.1%	35.9%	7.9%	*	*
ATLANTIQUE	321,752	9.2	38.7	40.8	10.2	*	*
QUÉBEC	1,074,626	11.9	34.9	38.9	12.6	*	*
ONTARIO	1,074,140	16.5	46.3	31.0	4.4	*	*
PRAIRIES	527,099	16.6	37.7	38.6	5.2	*	*
COLOMBIE-BRITANNIQUE	313,100	16.6	42.3	32.4	6.8	*	*
FEMMES							
CANADA	2,712,423	24.3%	42.4%	27.4%	4.6%	*	*
ATLANTIQUE	245,890	18.9	46.4	28.0	5.2	*	*
QUÉBEC	842,132	19.0	38.4	33.5	8.3	*	*
ONTARIO	926,777	27.3	44.9	23.8	2.5	*	*
PRAIRIES	420,755	27.2	43.5	25.8	2.5	*	*
COLOMBIE-BRITANNIQUE	276,870	30.7	41.2	23.0	3.1	*	*

* Estimation impossible à fournir en raison d'une extrême variabilité entre les échantillons.

TABLEAU 27

RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES ÂGÉS DE 15 ANS ET PLUS DES DEUX SEXES, SELON LA TENEUR EN GOUDRON DE LA MARQUE QUE L'ON FUME COURAMMENT ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION, CANADA, 1981

SCOLARITÉ	TOTAL DES FUMEURS	TENEUR EN GOUDRON DE LA MARQUE DE CONSOMMATION COURANTE					
		FAIBLE TENEUR (0-9 MG)	TENEUR MOYENNE (10-15 MG)	FORTE TENEUR (16 MG ET PLUS)	CIGARETTES ROULÉES À LA MAIN	AUTRES	NE SAVENT PAS
LES DEUX SEXES							
TOTAL	6,023,140	18.8%	41.1%	32.1%	6.5%	*	*
DE 0 À 8 ANS	1,306,571	14.0	33.5	35.8	15.4	*	*
PARTIE DU SECONDAIRE, PAS DE POSTSECONDAIRE	3,480,637	17.3	43.3	33.2	4.7	*	*
PARTIE DU POSTSECONDAIRE	407,345	26.7	42.0	27.4	1.9	*	*
CERTIFICAT OU DIPLÔME POSTSECONDAIRE	517,280	26.2	46.0	24.7	1.7	*	*
DIPLÔME UNIVERSITAIRE	311,307	32.5	40.4	21.7	1.6	*	*
HOMMES							
TOTAL	3,310,717	14.3%	40.1%	35.9%	7.9%	*	*
DE 0 À 8 ANS	829,328	10.9	31.9	38.5	17.3	*	*
PARTIE DU SECONDAIRE, PAS DE POSTSECONDAIRE	1,778,263	12.4	42.6	37.5	5.9	*	*
PARTIE DU POSTSECONDAIRE	225,346	22.3	39.7	33.5	2.1	*	*
CERTIFICAT OU DIPLÔME POSTSECONDAIRE	261,331	20.3	47.4	28.9	2.2	*	*
DIPLÔME UNIVERSITAIRE	216,448	27.9	42.4	22.9	2.1	*	*
FEMMES							
TOTAL	2,712,423	24.3%	42.4%	27.4%	4.6%	*	*
DE 0 À 8 ANS	477,243	19.4	36.4	31.1	12.2	*	*
PARTIE DU SECONDAIRE, PAS DE POSTSECONDAIRE	1,702,374	22.5	43.9	28.7	3.5	*	*
PARTIE DU POSTSECONDAIRE	181,998	32.2	44.7	19.9	*	*	*
CERTIFICAT OU DIPLÔME POSTSECONDAIRE	255,949	32.3	44.5	20.4	*	*	*
DIPLÔME UNIVERSITAIRE	94,859	42.8	35.9	18.7	*	*	*

* Estimation impossible à fournir en raison d'une extrême variabilité entre les échantillons.

TABLEAU 28

POPULATION DES FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES DE 15 ANS ET PLUS, SELON L'ÂGE OÙ L'ON A COMMENCÉ DE FUMER, L'ÂGE ACTUEL ET LE SEXE, CANADA, 1981

GROUPE D'ÂGE AU DÉBUT DE L'HABITUDE	TOTAL TOUS ÂGES	GROUPES D'ÂGE ACTUELS 15-19 ANS	20-24 ANS	25-34 ANS	35-44 ANS	45-54 ANS	55-64 ANS	65 ANS ET PLUS
TOTAL (LES DEUX SEXES)	6,023,140	509,005	940,331	1,609,559	1,079,936	908,725	635,145	343,140
POURCENTAGE TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
MOINS DE 15 ANS	19.0	32.9	22.8	20.7	16.3	12.3	14.4	15.7
15-19 ANS	60.2	66.7	71.6	64.8	58.3	55.0	49.0	39.1
20-24 ANS	13.4	-	4.9	11.6	17.7	20.5	20.5	19.4
25-34 ANS	4.8	-	-	2.5	5.9	8.6	10.4	13.1
35-44 ANS	1.2	-	-	-	1.0	2.2	2.7	6.3
45-54 ANS	.4	-	-	-	-	.3	1.2	2.9
55-64 ANS	.2	-	-	-	-	-	.5	2.0
65 ANS ET PLUS	*	-	-	-	-	-	-	.3
NON PRÉCISÉ	0.8	*	0.7	0.4	0.8	1.1	1.3	1.2
TOTAL DES HOMMES	3,310,717	255,979	469,320	886,847	617,360	510,024	364,993	206,195
POURCENTAGE TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
MOINS DE 15 ANS	21.3	29.7	20.9	22.5	20.0	16.6	20.5	22.6
15-19 ANS	62.1	69.6	73.7	65.4	59.0	58.7	52.8	47.1
20-24 ANS	12.0	-	4.9	9.7	15.1	17.2	19.0	18.0
25-34 ANS	3.1	-	-	1.7	3.9	5.4	5.5	7.4
35-44 ANS	0.5	-	-	-	0.8	0.5	0.5	0.7
45-54 ANS	0.1	-	-	-	-	0.3	*	*
55-64 ANS	*	-	-	-	-	-	-	*
65 ANS ET PLUS	*	-	-	-	-	-	-	*
NON PRÉCISÉ	0.8	0.7	0.5	0.7	1.2	1.3	1.4	0.6
TOTAL DES FEMMES	2,712,423	253,026	471,011	772,712	462,576	398,702	267,452	136,944
POURCENTAGE TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
MOINS DE 15 ANS	16.3	36.1	24.7	18.5	11.3	6.7	5.9	5.2
15-19 ANS	57.9	63.9	69.4	64.1	57.3	50.3	43.7	27.1
20-24 ANS	15.1	-	4.8	13.8	21.1	24.7	22.6	21.5
25-34 ANS	7.0	-	-	3.4	8.5	12.6	17.0	21.6
35-44 ANS	1.9	-	-	-	1.3	4.5	5.6	10.4
45-54 ANS	0.7	-	-	-	-	0.4	3.2	6.2
55-64 ANS	0.4	-	-	-	-	-	0.9	5.2
65 ANS ET PLUS	*	-	-	-	-	-	-	0.7
NON PRÉCISÉ	0.7	-	1.1	0.2	0.5	0.8	1.1	2.1

TABLEAU 29

RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES, SELON LES ANNÉES D'EXPOSITION À L'USAGE DU TABAC, LA RÉGION GÉOGRAPHIQUE ET LE SEXE; CANADA, 1981

	CANADA	ATLANTIQUE	QUÉBEC	ONTARIO	PRAIRIES	COLOMBIE-BRITANNIQUE
TOTAL (LES DEUX SEXES)	6,023,140	567,641	1,916,758	2,000,196	947,854	589,970
NOMBRE D'ANNÉES D'EXPOSITION - % TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
MOINS DE 10 ANS	27.8	29.3	28.9	26.9	30.0	26.3
10 À 19 ANS	27.5	27.7	27.4	26.5	27.9	27.5
20 ANS OU PLUS	43.8	42.0	43.4	45.6	41.0	44.8
DURÉE INCONNUE	0.8	1.0	0.3	1.0	1.1	1.4
TOTAL DES HOMMES	3,310,717	321,752	1,074,626	1,074,140	527,099	313,100
NOMBRE D'ANNÉES D'EXPOSITION - % TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
MOINS DE 10 ANS	25.2	27.0	24.6	25.8	26.3	22.3
10 À 19 ANS	26.3	25.4	26.4	25.1	27.5	28.6
20 ANS OU PLUS	47.6	46.3	48.6	48.0	44.8	48.3
DURÉE INCONNUE	0.9	1.3	0.4	1.1	1.4	0.8
TOTAL DES FEMMES	2,712,423	245,890	842,132	926,777	420,755	276,870
NOMBRE D'ANNÉES D'EXPOSITION - % TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
MOINS DE 10 ANS	31.0	32.3	34.4	28.2	34.6	23.1
10 À 19 ANS	29.1	30.8	28.8	28.2	28.4	32.3
20 ANS ET PLUS	39.3	36.4	36.7	42.6	36.2	43.4
DURÉE INCONNUE	0.6	0.5	0.1	1.0	0.8	1.2

TABLEAU 30

NOMBRE ESTIMATIF D'HABITUÉS DE LA CIGARETTE AYANT TENTÉ DE CESSER DE FUMER AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, SELON LE SEXE, LE GROUPE D'ÂGE ET LA RÉGION, CANADA, 1981

FUMEURS DE L'UN ET L'AUTRE SEXE RÉPARTIS PAR RÉGION	FUMEURS AYANT CHERCHÉ À RENONCER À LEUR HABITUDE							
		GROUPES D'ÂGE						
	TOTAL TOUS ÂGES	15-19 ANS	20-24 ANS	25-34 ANS	35-44 ANS	45-54 ANS	55-64 ANS	65 ANS ET PLUS
TOTAL (LES DEUX SEXES)								
ENSEMBLE DU CANADA.....	2,228,158	206,800	392,548	618,654	401,739	290,893	213,552	103,972
RÉGIONS								
ATLANTIQUE.....	199,898	20,186	36,613	62,224	31,914	22,023	16,318	10,621
QUÉBEC.....	829,852	82,146	144,691	210,984	156,038	107,524	84,942	43,528
ONTARIO.....	729,695	61,281	137,451	205,956	132,514	101,715	67,595	23,182
PRAIRIES.....	281,855	26,417	46,069	80,933	48,188	34,515	28,354	17,378
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	186,858	16,769	27,724	58,557	33,085	25,118	16,342	9,263
HOMMES								
ENSEMBLE DU CANADA.....	1,211,004	103,362	189,086	340,727	245,539	159,799	113,330	59,161
RÉGIONS								
ATLANTIQUE.....	107,299	11,311	17,331	33,659	16,788	11,624	9,220	7,366
QUÉBEC.....	451,199	41,504	66,923	122,157	92,204	54,997	49,263	24,151
ONTARIO.....	405,120	34,338	68,612	110,364	87,349	61,284	30,704	12,469
PRAIRIES.....	149,146	10,276	20,071	44,059	29,232	18,679	15,702	11,127
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	98,240	5,933	16,149	30,487	19,966	13,215	8,442	4,048
FEMMES								
ENSEMBLE DU CANADA.....	1,017,154	103,437	203,462	277,927	156,200	131,095	100,222	44,811
RÉGIONS								
ATLANTIQUE.....	92,599	8,875	19,282	28,565	15,126	10,399	7,098	3,255
QUÉBEC.....	378,654	40,642	77,768	88,827	63,834	52,527	35,679	19,377
ONTARIO.....	324,575	26,943	68,839	95,591	45,166	40,431	36,892	10,713
PRAIRIES.....	132,708	16,141	25,999	36,874	18,956	15,835	12,652	6,251
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	88,618	10,836	11,575	28,070	13,119	11,903	7,901	5,215

TABLEAU 31

POURCENTAGE ESTIMATIF D'HABITUÉS DE LA CIGARETTE AYANT TENTÉ DE CESSER DE FUMER AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, SELON LE SEXE, LE GROUPE D'ÂGE ET LA RÉGION, CANADA, 1981

FUMEURS DE L'UN ET L'AUTRE SEXE RÉPARTIS PAR RÉGION	FUMEURS AYANT CHERCHÉ À RENONCER À LEUR HABITUDE							
	GROUPES D'ÂGE							
	TOTAL TOUS ÂGES	15-19 ANS	20-24 ANS	25-34 ANS	35-44 ANS	45-54 ANS	55-64 ANS	65 ANS ET PLUS
TOTAL (LES DEUX SEXES)								
ENSEMBLE DU CANADA.....	37.0%	40.6%	41.7%	38.4%	37.2%	32.0%	33.8%	30.3%
RÉGIONS								
ATLANTIQUE.....	35.2	36.7	39.2	40.3	31.1	30.9	28.4	31.8
QUÉBEC.....	43.3	43.6	49.7	43.5	45.2	37.9	39.2	41.1
ONTARIO.....	36.5	41.3	42.8	39.4	37.3	29.5	34.1	20.8
PRAIRIES.....	29.7	33.2	29.9	29.0	28.3	27.8	31.9	33.4
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	31.7	40.4	34.5	34.8	30.9	29.4	23.0	23.0
HOMMES								
ENSEMBLE DU CANADA.....	36.6	40.4	40.3	38.4	39.8	31.3	31.0	28.7
RÉGIONS								
ATLANTIQUE.....	33.3	36.2	34.2	40.3	30.1	29.1	25.5	30.2
QUÉBEC.....	42.0	43.7	47.4	45.2	46.2	32.2	38.0	35.3
ONTARIO.....	37.7	46.4	43.3	39.1	42.5	33.3	28.2	20.6
PRAIRIES.....	28.3	28.1	26.4	27.3	30.1	26.4	30.7	32.7
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	31.4	31.1	37.6	34.0	33.9	29.8	21.6	21.3
FEMMES								
ENSEMBLE DU CANADA.....	37.5	40.9	43.2	38.5	33.8	32.9	37.5	32.7
RÉGIONS								
ATLANTIQUE.....	37.7	37.4	45.1	40.2	32.3	33.2	33.5	35.9
QUÉBEC.....	45.0	43.6	51.9	41.2	43.8	46.6	40.8	51.4
ONTARIO.....	35.0	36.2	42.3	39.8	30.3	25.2	41.3	21.1
PRAIRIES.....	31.5	37.5	33.3	31.4	26.0	29.7	33.4	34.6
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	32.0	58.3	30.9	35.7	27.3	29.0	24.9	24.5

TABLEAU 32

NOMBRE ESTIMATIF DES FUMEURS D'HABITUDE AYANT TENTÉ DE CESSER DE FUMER AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, SELON LE SEXE, LA RÉGION ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION, CANADA, 1981

	TOTAL	INSTRUCTION				
		DE 0 À 8	PARTIE DU SECONDAIRE, PAS DE POSTSECONDAIRE	PARTIE DU POST-SECONDAIRE	CERTIFICAT OU DIPLÔME POSTSECONDAIRE	DIPLÔME UNIVERSITAIRE
TOTAL (LES DEUX SEXES)						
ENSEMBLE DU CANADA.....	2,228,158	492,017	1,245,190	157,924	207,641	125,385
RÉGIONS						
ATLANTIQUE.....	199,898	52,728	106,898	13,827	18,501	7,944
QUÉBEC.....	829,852	250,169	404,219	52,112	82,339	41,013
ONTARIO.....	729,695	129,218	442,353	51,477	60,180	46,467
PRAIRIES.....	281,855	43,352	171,516	20,300	27,511	19,175
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	186,858	16,550	120,204	20,208	19,111	10,785
HOMMES						
ENSEMBLE DU CANADA.....	1,211,004	290,896	643,086	87,656	102,493	86,874
RÉGIONS						
ATLANTIQUE.....	107,299	30,853	54,649	7,108	9,075	5,614
QUÉBEC.....	451,199	137,892	217,421	29,410	38,627	27,848
ONTARIO.....	405,120	82,667	226,837	31,711	31,252	32,653
PRAIRIES.....	149,146	27,965	86,501	6,274	14,759	13,648
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	98,240	11,518	57,677	13,152	8,780	7,112
FEMMES						
ENSEMBLE DU CANADA.....	1,017,154	201,121	602,104	70,269	105,149	38,511
RÉGIONS						
ATLANTIQUE.....	92,599	21,875	52,248	6,719	9,426	2,331
QUÉBEC.....	378,654	112,277	186,798	22,702	43,712	13,165
ONTARIO.....	324,575	46,551	215,516	19,766	28,928	13,814
PRAIRIES.....	132,708	15,387	85,015	14,026	12,752	5,527
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	88,618	5,031	62,527	7,056	10,331	3,673

TABLEAU 33

POURCENTAGE ESTIMATIF DES FUMEURS D'HABITUDE AYANT TENTÉ DE CESSER DE FUMER AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, SELON LE SEXE, LA RÉGION ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION, CANADA, 1981

	TOTAL	INSTRUCTION				
		DE 0 À 8	PARTIE DU SECONDAIRE, PAS DE POSTSECONDAIRE	PARTIE DU POST-SECONDAIRE	CERTIFICAT OU DIPLÔME POSTSECONDAIRE	DIPLÔME UNIVERSITAIRE
TOTAL (LES DEUX SEXES)						
ENSEMBLE DU CANADA.....	37.0%	37.7%	35.8%	38.8%	40.1%	40.3%
RÉGIONS						
ATLANTIQUE.....	35.2	30.4	36.3	46.6	37.8	37.5
QUÉBEC.....	43.3	44.8	40.8	48.5	49.5	43.7
ONTARIO.....	36.5	34.5	36.4	37.9	37.4	40.7
PRAIRIES.....	29.7	30.4	29.0	29.5	30.3	35.4
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	31.7	28.7	31.0	30.8	37.8	38.6
HOMMES						
ENSEMBLE DU CANADA.....	36.6	35.1	36.2	38.9	39.2	40.1
RÉGIONS						
ATLANTIQUE.....	33.3	27.0	35.3	44.3	39.0	42.0
QUÉBEC.....	42.0	40.7	42.2	51.3	40.9	40.2
ONTARIO.....	37.7	34.3	38.0	37.6	41.8	42.7
PRAIRIES.....	28.3	29.1	27.4	19.1	32.3	36.3
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	31.4	29.3	29.4	37.8	37.9	36.0
FEMMES						
ENSEMBLE DU CANADA.....	37.5	42.1	35.4	38.6	41.1	40.6
RÉGIONS						
ATLANTIQUE.....	37.7	37.0	37.4	49.1	36.7	29.9
QUÉBEC.....	45.0	51.2	39.2	45.3	60.9	53.6
ONTARIO.....	35.0	34.8	34.9	38.4	33.6	36.6
PRAIRIES.....	31.5	33.0	30.7	39.0	28.3	33.3
COLOMBIE-BRITANNIQUE.....	32.0	27.4	32.5	22.9	37.7	45.0

TABLEAU 34

NOMBRE D'HABITUÉS DE LA CIGARETTE AYANT FAIT UN EFFORT MANIFESTE POUR RÉDUIRE LEUR TAUX DE CONSOMMATION, SELON LE GROUPE D'ÂGE ET LE SEXE, CANADA, 1981

	NOMBRE DE FUMEURS RÉGULIERS	NOMBRE DE CEUX QUI ONT FAIT UN EFFORT MANIFESTE POUR RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION	POURCENTAGE DE CEUX QUI ONT TENTÉ DE RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION
TOTAL	6,023,140	1,148,893	19.1%
15-19	509,005	92,444	18.2
20-24	940,331	195,414	20.8
25-34	1,609,559	297,198	18.5
35-44	1,079,936	188,275	17.4
45-54	908,725	171,800	18.9
55-64	632,445	114,411	18.1
65 ET PLUS	343,140	89,351	26.0
HOMMES			
TOTAL	3,310,717	597,653	18.1
15-19	255,979	41,898	16.4
20-24	469,320	87,404	18.6
25-34	886,847	153,228	17.3
35-44	617,360	110,493	17.9
45-54	510,024	86,501	17.0
55-64	364,993	57,798	15.8
65 ET PLUS	206,195	60,330	29.3
FEMMES			
TOTAL	2,712,423	551,240	20.3
15-19	253,026	50,546	20.0
20-24	471,011	108,010	22.9
25-34	722,712	143,971	19.9
35-44	462,576	77,782	16.8
45-54	398,702	85,299	21.4
55-64	267,452	56,612	21.2
65 ET PLUS	136,944	29,020	21.2

TABLEAU 35

NOMBRE ET POURCENTAGE DES FUMEURS D'HABITUDE DE 15 ANS ET PLUS QUI ONT FAIT UN EFFORT MANIFESTE POUR RÉDUIRE LEUR TAUX DE CONSOMMATION, SELON LA RÉGION ET LE SEXE, CANADA, 1981

RÉGIONS	NOMBRE DE FUMEURS RÉGULIERS		POURCENTAGE DE CEUX QUI ONT FAIT UN EFFORT MANIFESTE POUR RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION	
	HOMMES	FEMMES	HOMMES	FEMMES
CANADA	3,310,717	2,712,423	18.1%	20.3%
ATLANTIQUE	321,752	245,890	14.3	19.8
QUÉBEC	1,074,629	842,132	16.8	17.6
ONTARIO	1,074,140	926,777	20.1	21.4
PRAIRIES	527,099	420,755	16.6	21.4
COLOMBIE-BRITANNIQUE	313,100	276,870	17.8	23.9

TABLEAU 36

FUMEURS D'HABITUDE DE 15 ANS ET PLUS QUI ONT FAIT UN EFFORT MANIFESTE POUR RÉDUIRE LEUR TAUX DE CONSOMMATION, LEUR NOMBRE ÉTANT EXPRIMÉ EN POURCENTAGE PAR RAPPORT À L'ENSEMBLE DES FUMEURS, SELON LE SEXE ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION, CANADA, 1981

	NOMBRE DE FUMEURS	NOMBRE DE CEUX QUI ONT FAIT UN EFFORT MANIFESTE POUR RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION	POURCENTAGE DE CEUX QUI ONT TENTÉ DE RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION
TOTAL	6,023,140	1,148,893	19.1%
DE 0 À 8 ANS	1,306,571	241,615	18.5
PARTIE DU SECONDAIRE, PAS DE POSTSECONDAIRE	3,480,637	655,686	18.8
PARTIE DU POSTSECONDAIRE	407,345	86,673	21.3
CERTIFICAT OU DIPLÔME POSTSECONDAIRE	517,280	99,695	19.3
DIPLÔME UNIVERSITAIRE	311,307	65,223	21.0
HOMMES			
TOTAL	3,310,717	597,653	18.1
DE 0 À 8 ANS	829,328	143,961	17.4
PARTIE DU SECONDAIRE, PAS DE POSTSECONDAIRE	1,778,263	326,628	18.4
PARTIE DU POSTSECONDAIRE	225,346	39,264	17.4
CERTIFICAT OU DIPLÔME POSTSECONDAIRE	261,331	40,513	15.5
DIPLÔME UNIVERSITAIRE	216,448	47,286	21.8
FEMMES			
TOTAL	2,712,423	551,240	20.3
DE 0 À 8 ANS	477,243	97,654	20.5
PARTIE DU SECONDAIRE, PAS DE POSTSECONDAIRE	1,702,374	329,058	19.3
PARTIE DU POSTSECONDAIRE	181,998	47,408	26.0
CERTIFICAT OU DIPLÔME POSTSECONDAIRE	255,949	59,182	23.1
DIPLÔME UNIVERSITAIRE	94,859	17,938	18.9

TABLEAU 37

TAUX D'ABANDON DE L'USAGE DU TABAC CHEZ LES CANADIENS QUI ONT DÉJÀ FUMÉ RÉGULIÈREMENT, SELON LE SEXE ET LE GROUPE D'ÂGE, CANADA, 1981

SEXE	EX-FUMEURS	CONTINUENT À FUMER	ONT DÉJÀ FUMÉ RÉGULIÈREMENT	POURCENTAGE D'ABANDON CHEZ CEUX QUI FUMAIENT RÉGULIÈREMENT
HOMMES				
Total	1,776,438	3,310,717	5,087,155	34.9%
15-19	20,499	255,979	276,478	7.4
20-24	92,725	469,320	562,045	16.0
25-34	342,818	886,847	1,229,665	27.9
35-44	363,392	617,360	980,752	37.0
45-54	309,383	510,024	819,407	37.8
55-64	303,438	364,993	668,431	45.0
65 et plus	344,183	206,195	550,378	62.5
FEMMES				
Total	1,037,248	2,712,423	3,749,671	27.7
15-19	39,489	253,026	292,515	13.5
20-24	110,823	471,011	581,834	19.0
25-34	261,842	722,712	984,554	26.6
35-44	204,719	462,576	667,295	30.7
45-54	139,267	398,702	537,969	25.9
55-64	151,156	276,452	418,608	36.1
65 et plus	129,952	136,944	266,896	48.6

Pour calculer la proportion de "lâcheurs" parmi ceux qui ont déjà fumé régulièrement, on divise le nombre d'ex-fumeurs par le nombre de ceux qui ont déjà fumé régulièrement.

TABLEAU 38

NOMBRE ET POURCENTAGE D'ANCIENS FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES CHEZ LES 15 ANS ET PLUS, SELON LE SEXE ET LA RÉGION, CANADA, 1981

SEXE	RÉGIONS	NOMBRE D'EX-FUMEURS	POURCENTAGE D'EX-FUMEURS PAR RAPPORT À LA POPULATION	RAPPORT FUMEURS/ EX-FUMEURS
LES DEUX SEXES	CANADA	2,813,686	15.3%	2.14
	ATLANTIQUE	236,307	14.2	2.40
	QUÉBEC	774,014	15.7	2.48
	ONTARIO	1,007,717	15.1	1.99
	PRAIRIES	444,583	14.4	2.13
	COLOMBIE-BRITANNIQUE	351,065	16.8	1.68
HOMMES	CANADA	1,776,438	19.7	1.86
	ATLANTIQUE	151,351	18.4	2.13
	QUÉBEC	482,259	20.1	2.23
	ONTARIO	635,193	19.6	1.69
	PRAIRIES	287,892	18.7	1.83
	COLOMBIE-BRITANNIQUE	219,743	21.4	1.42
FEMMES	CANADA	1,037,248	11.0	2.62
	ATLANTIQUE	84,956	10.0	2.89
	QUÉBEC	291,755	11.6	2.89
	ONTARIO	372,524	10.9	2.49
	PRAIRIES	156,691	10.1	2.69
	COLOMBIE-BRITANNIQUE	131,322	12.4	2.11

Le rapport (ou ratio) s'obtient en divisant le nombre de fumeurs par celui des ex-fumeurs.

TABLEAU 39

NOMBRE ET POURCENTAGE D'ANCIENS FUMEURS RÉGULIERS DE CIGARETTES CHEZ LES 15 ANS ET PLUS, SELON LE SEXE ET LE GROUPE D'ÂGE, CANADA, 1981

SEXE	GROUPES D'ÂGE	NOMBRE D'EX-FUMEURS	POURCENTAGE D'EX-FUMEURS PAR RAPPORT À LA POPULATION	RAPPORT FUMEURS/ EX-FUMEURS
LES DEUX SEXES	TOTAL 15 ANS ET PLUS	2,813,686	15.2%	2.14
	15-19	59,988	2.7	8.49
	20-24	203,548	8.7	4.62
	25-44	1,172,772	16.6	2.29
	45-64	903,244	19.8	1.71
	65 ANS ET PLUS	474,135	21.2	.72
	TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	2,753,698	17.0	2.00
HOMMES	TOTAL 15 ANS ET PLUS	1,776,438	19.7	1.86
	15-19	20,499	1.8 Q	12.49
	20-24	92,725	7.9	5.06
	25-44	706,210	20.0	2.13
	45-64	612,821	27.5	1.43
	65 ANS ET PLUS	344,183	35.5	0.60
	TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	1,755,939	22.2	1.74
FEMMES	TOTAL 15 ANS ET PLUS	1,037,248	11.0	2.62
	15-19	39,489	3.7 Q	6.41
	20-24	110,823	9.6	4.25
	25-44	466,561	19.9	2.54
	45-64	290,423	12.4	2.29
	65 ANS ET PLUS	129,952	10.2	1.05
	TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	997,759	12.0	2.46

Le rapport (ou ratio) s'obtient en divisant le nombre de fumeurs par celui des ex-fumeurs.

Q - Forte variabilité entre les échantillons, utiliser avec précaution.

TABLEAU 40

NOMBRE ET POURCENTAGE DE NON-FUMEURS DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, PAR SEXE ET GROUPE D'ÂGE, CANADA, 1981

SEXE	GROUPE D'ÂGE	POPULATION TOTALE (N) (EN MILLIERS)	NON-FUMEURS NOMBRE (n) EN MILLIERS)	NON-FUMEURS POURCENTAGE
LES DEUX SEXES	TOTAL 15 ANS ET PLUS	18,420.4	11,390.3	61.8%
	15 - 19	2,205.0	1,597.5	72.4
	20 - 24	2,329.2	1,274.0	54.7
	25 - 44	7,081.5	3,988.6	56.3
	45 - 64	4,568.4	2,759.1	60.4
	65 ANS ET PLUS	2,236.3	1,771.1	79.2
	TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	16,215.4	9,792.8	60.4
HOMMES	TOTAL DES 15 ANS ET PLUS	9,026.3	5,050.9	56.0
	15 - 19	1,123.3	815.7	72.6
	20 - 24	1,175.3	643.3	54.7
	25 - 44	3,531.6	1,754.5	49.7
	45 - 64	2,227.4	1,163.7	52.2
	65 ANS ET PLUS	968.6	673.6	69.5
	TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	7,902.9	4,235.2	53.6
FEMMES	TOTAL 15 ANS ET PLUS	9,394.1	6,339.4	67.5
	15 - 19	1,081.7	781.8	72.3
	20 - 24	1,153.7	630.7	54.7
	25 - 44	3,549.9	2,234.1	62.9
	45 - 64	2,341.0	1,595.4	68.1
	65 ANS ET PLUS	1,267.7	1,097.4	86.6
	TOTAL 20 ANS ET PLUS	8,312.4	5,557.6	66.9

Source: Statistique Canada, Supplément de l'Enquête sur la population active, décembre 1981.

TABLEAU 41

POURCENTAGE DE NON-FUMEURS DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, PAR SEXE ET GROUPE D'ÂGE, CANADA, 1965 À 1981

GROUPE D'ÂGE	1965	1970	1974(a)	1977	1979	1981
LES DEUX SEXES						
15 ANS ET PLUS	50.2	52.9	55.3	58.1	60.1	61.8
15-19	68.9	65.1	64.3	67.7	68.7	72.4
20-24	42.6	46.0	48.0	51.5	54.4	54.7
25-44	42.1	45.7	49.2	52.1	54.3	56.3
45-64	48.1	52.5	55.2	57.6	59.3	60.4
65 ANS ET PLUS	66.8	70.3	73.2	74.3	76.9	79.2
TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	47.2	51.0	53.9	56.6	58.8	60.4
HOMMES						
15 ANS ET PLUS	34.8	41.1	43.3	50.9	53.6	56.0
15-19	60.3	59.1	61.5	67.3	68.6	72.6
20-24	30.4	38.0	40.5	48.2	51.8	54.7
25-44	27.8	34.8	39.5	44.7	48.3	49.7
45-64	30.1	38.4	43.1	48.8	50.4	52.2
65 ANS ET PLUS	42.3	49.2	55.9	60.0	63.3	70.5
TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	30.6	38.1	42.9	48.2	51.3	53.6
FEMMES						
15 ANS ET PLUS	65.3	64.5	65.1	65.0	66.3	67.5
15-19	77.8	71.3	67.2	68.1	68.8	72.3
20-24	54.4	54.2	55.8	54.8	56.9	54.7
25-44	56.1	56.6	59.0	59.6	60.3	62.9
45-64	66.2	66.1	66.8	66.0	67.7	68.1
65 ANS ET PLUS	88.8	87.9	86.8	85.2	87.5	86.6
TOTAL DES 20 ANS ET PLUS	63.4	63.5	64.8	64.6	66.0	66.9

Notes: (a) Les pourcentages de non-fumeurs dans la population des 15 ans et plus pour l'année 1975 ont été estimés à partir des données de l'Enquête sur la population active de 1973 et 1974 (voir "Usage du tabac au Canada", 1965-1974, Rapport technique nº 1, Direction de l'usage non médical des drogues).

Source: Statistique Canada, Suppléments de l'Enquête sur la population active.

TABLEAU 42

NOMBRE DE NON-FUMEURS DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, PAR SEXE, GROUPE D'ÂGE ET RÉGION, CANADA, 1981

	NON-FUMEURS					
	CANADA	RÉGIONS				
	TOTAL	ATLANTIQUE	QUÉBEC	ONTARIO	PRAIRIES	COLOMBIE-BRITANNIQUE
LES DEUX SEXES						
TOTAL						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS	11,390,346	1,011,219	2,744,979	4,243,305	1,990,487	1,400,357
15 - 19	1,597,494	160,270	375,375	605,859	275,144	180,846
20 - 24	1,274,064	116,437	316,954	449,735	237,553	153,386
25 - 44	3,988,584	335,108	1,005,689	1,463,863	697,324	486,601
45 - 64	2,759,142	230,417	647,212	1,062,119	472,047	347,347
65 ANS ET PLUS	1,771,062	168,987	399,749	661,728	308,420	232,177
20 ANS ET PLUS	9,792,852	850,949	2,369,604	3,637,446	1,715,343	1,219,511
HOMMES						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS	5,050,936	442,005	1,168,495	1,882,502	909,612	648,323
15 - 19	815,734	76,403	196,035	308,967	143,753	90,575
20 - 24	643,337	55,828	165,804	227,581	119,633	74,491
25 - 44	1,754,498	151,959	433,028	631,893	313,340	224,278
45 - 64	1,163,737	96,090	242,439	458,267	208,099	158,842
65 ANS ET PLUS	673,630	61,725	131,188	255,794	124,786	100,137
20 ANS ET PLUS	4,235,203	365,602	972,459	1,573,535	765,859	557,748
FEMMES						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS	6,339,410	569,214	1,576,484	2,360,803	1,080,875	752,034
15 - 19	781,760	83,867	179,340	296,892	131,391	90,271
20 - 24	630,727	60,608	151,150	222,154	117,919	78,895
25 - 44	2,234,086	183,149	572,660	831,970	383,983	262,323
45 - 64	1,595,405	134,327	404,773	603,852	263,948	188,505
65 ANS ET PLUS	1,097,431	107,262	268,561	405,935	183,634	132,040
20 ANS ET PLUS	5,557,650	485,347	1,397,144	2,063,911	949,484	661,763

TABLEAU 43

POURCENTAGE DE NON-FUMEURS DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, PAR SEXE, GROUPE D'ÂGE ET RÉGION, CANADA, 1981

	NON-FUMEURS EN POURCENTAGE DE POPULATION					
	CANADA	RÉGIONS				
	TOTAL	ATLANTIQUE	QUÉBEC	ONTARIO	PRAIRIES	COLOMBIE-BRITANNIQUE
LES DEUX SEXES						
TOTAL						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS.....	61.8%	60.6%	55.8%	63.8%	64.4%	67.1%
15 - 19.....	72.4	70.3	63.9	77.2	73.2	79.0
20 - 24.....	54.7	52.5	50.4	54.9	57.2	62.7
25 - 44.....	60.4	61.0	53.1	61.9	65.0	65.6
45 - 64.....	79.2	79.2	73.5	81.0	82.0	81.2
65 ANS ET PLUS.....	60.4	59.0	54.8	62.0	63.1	65.6
20 ANS ET PLUS.....						
HOMMES						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS.....	56.0	53.8	48.8	58.0	59.1	63.2
15 - 19.....	72.6	66.0	65.5	77.0	75.3	77.7
20 - 24.....	54.7	49.8	52.3	54.9	57.0	61.0
25 - 44.....	49.7	48.4	44.9	50.7	51.6	56.3
45 - 64.....	52.2	52.0	41.5	54.7	57.8	61.1
65 ANS ET PLUS.....	69.5	64.6	57.4	74.1	72.9	78.3
20 ANS ET PLUS.....	53.6	51.7	46.4	55.3	56.8	61.4
FEMMES						
TOUS ÂGES						
15 ANS ET PLUS.....	67.5	67.2	62.6	69.2	69.6	70.8
15 - 19.....	72.3	74.8	62.3	77.3	71.0	80.4
20 - 24.....	54.7	55.2	48.5	54.9	57.5	64.4
25 - 44.....	62.9	58.2	59.0	65.4	64.9	65.6
45 - 64.....	68.1	69.6	63.8	68.8	72.0	69.9
65 ANS ET PLUS.....	86.6	91.0	85.2	86.1	89.6	83.5
20 ANS ET PLUS.....	66.9	66.0	62.6	68.2	69.4	69.6

TABLEAU 44

RÉPARTITION ESTIMATIVE DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, PAR SEXE, RÉGION ET NIVEAU D'INSTRUCTION, CANADA, 1981

	TOTAL	INSTRUCTION				
		DE 0 À 8	PARTIE DU SECONDAIRE PAS DE POSTSECONDAIRE	PARTIE DU POST-SECONDAIRE	CERTIFICAT OU DIPLÔME POSTSECONDAIRE	DIPLÔME UNIVERSITAIRE
LES DEUX SEXES						
TOTAL						
CANADA						
TOTAL	18,420,364	3,956,826	9,573,320	1,469,336	1,834,599	1,586,283
RÉGIONS						
ATLANTIQUE	1,669,715	458,743	832,312	103,234	162,055	113,371
QUÉBEC	4,914,970	1,381,916	2,354,900	305,330	514,580	358,244
ONTARIO	6,655,517	1,316,293	3,484,373	572,457	643,786	638,608
PRAIRIES	3,092,518	541,520	1,689,207	250,401	323,883	287,507
COLOMBIE-BRITANNIQUE	2,087,644	258,354	1,212,529	237,914	190,295	188,552
HOMMES						
CANADA						
TOTAL	9,026,309	1,990,094	4,498,751	776,316	788,584	972,564
RÉGIONS						
ATLANTIQUE	822,203	254,392	396,351	49,064	57,530	64,866
QUÉBEC	2,394,637	641,923	1,106,812	165,691	250,655	229,556
ONTARIO	3,245,401	668,873	1,609,963	315,540	259,717	391,308
PRAIRIES	1,538,993	281,186	818,716	128,416	141,266	169,409
COLOMBIE-BRITANNIQUE	1,025,075	143,720	566,909	117,605	79,416	117,425
FEMMES						
CANADA						
TOTAL	9,394,055	1,966,732	5,074,569	693,020	1,046,015	613,720
RÉGIONS						
ATLANTIQUE	847,513	204,351	435,961	54,170	104,525	48,506
QUÉBEC	2,520,332	739,993	1,248,087	139,639	263,925	128,688
ONTARIO	3,410,116	647,420	1,874,409	256,918	384,069	247,301
PRAIRIES	1,553,525	260,334	870,491	121,985	182,617	118,098
COLOMBIE-BRITANNIQUE	1,062,569	114,634	645,620	120,309	110,880	71,127

TABLEAU 45

NOMBRE DE NON-FUMEURS DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, PAR SEXE, RÉGION ET NIVEAU D'INSTRUCTION, CANADA, 1981

	NON-FUMEURS					
		INSTRUCTION				
	TOTAL	DE 0 À 8	PARTIE DU SECONDAIRE PAS DE POSTSECONDAIRE	PARTIE DU POST-SECONDAIRE	CERTIFICAT OU DIPLÔME POSTSECONDAIRE	DIPLÔME UNIVERSITAIRE
LES DEUX SEXES						
TOTAL						
CANADA						
TOTAL	11,390,346	2,431,913	5,625,730	968,032	1,205,989	1,158,682
RÉGIONS						
ATLANTIQUE	1,011,219	258,568	493,111	67,706	104,621	87,213
QUÉBEC	2,744,979	744,566	1,268,714	174,747	320,026	236,926
ONTARIO	4,243,305	866,919	2,085,853	390,353	436,189	463,992
PRAIRIES	1,990,487	371,401	1,010,920	170,785	216,686	220,695
COLOMBIE-BRITANNIQUE	1,400,357	190,460	767,133	164,440	128,467	149,856
HOMMES						
CANADA						
TOTAL	5,050,936	1,005,975	2,428,502	489,200	465,018	662,241
RÉGIONS						
ATLANTIQUE	442,005	120,751	212,823	29,670	30,275	48,486
QUÉBEC	1,168,495	252,827	538,360	97,761	141,181	138,367
ONTARIO	1,882,502	369,910	893,963	198,227	156,507	263,894
PRAIRIES	909,612	165,159	449,829	87,785	84,356	122,484
COLOMBIE-BRITANNIQUE	648,323	97,329	333,528	75,758	52,699	89,010
FEMMES						
CANADA						
TOTAL	6,339,410	1,425,938	3,197,228	478,832	740,971	496,441
RÉGIONS						
ATLANTIQUE	569,214	137,817	280,288	38,036	74,345	38,727
QUÉBEC	1,576,484	491,739	730,354	76,987	178,845	98,559
ONTARIO	2,360,803	497,008	1,191,889	192,126	279,681	200,097
PRAIRIES	1,080,875	206,242	561,091	83,000	132,330	98,212
COLOMBIE-BRITANNIQUE	752,034	93,131	433,605	88,683	75,769	60,846

TABLEAU 46

POURCENTAGE DE NON-FUMEURS DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, PAR SEXE, RÉGION ET NIVEAU D'INSTRUCTION, CANADA, 1981

	NON-FUMEURS EN POURCENTAGE DE POPULATION					
		INSTRUCTION				
	TOTAL	DE 0 À 8	PARTIE DU SECONDAIRE PAS DE POSTSECONDAIRE	PARTIE DU POST-SECONDAIRE	CERTIFICAT OU DIPLÔME POST-SECONDAIRE	DIPLÔME UNIVERSITAIRE
LES DEUX SEXES						
TOTAL						
CANADA						
TOTAL	61.8%	61.5%	58.8%	65.9%	65.7%	73.0%
RÉGIONS						
ATLANTIQUE	60.6	56.4	59.2	65.6	64.6	76.9
QUÉBEC	55.8	53.9	53.9	57.2	62.2	66.1
ONTARIO	63.8	65.9	59.9	68.2	67.8	72.7
PRAIRIES	64.4	68.6	59.8	68.2	66.9	76.8
COLOMBIE-BRITANNIQUE	67.1	73.7	63.3	69.1	67.5	79.5
HOMMES						
CANADA						
TOTAL	56.0	50.5	54.0	63.0	59.0	68.1
RÉGIONS						
ATLANTIQUE	53.8	47.5	53.7	60.5	52.6	74.7
QUÉBEC	48.8	39.4	48.6	59.0	56.3	60.3
ONTARIO	58.0	55.3	55.5	62.8	60.3	67.4
PRAIRIES	59.1	58.7	54.9	68.4	59.7	72.3
COLOMBIE-BRITANNIQUE	63.2	67.7	58.8	64.4	66.4	75.8
FEMMES						
CANADA						
TOTAL	67.5	72.5	63.0	69.1	70.8	80.9
RÉGIONS						
ATLANTIQUE	67.2	67.4	64.3	70.2	71.1	79.8
QUÉBEC	62.6	66.5	58.5	55.1	67.8	76.6
ONTARIO	69.2	76.8	63.6	74.8	72.8	80.9
PRAIRIES	69.6	79.2	64.5	68.0	72.5	83.2
COLOMBIE-BRITANNIQUE	70.8	81.2	67.2	73.7	68.3	85.5

TABLEAU 47

VENTES NATIONALES ET CONSOMMATION PAR HABITANT
DE CIGARETTES TOUTES FAITES ET ROULÉES À LA MAIN, CANADA, 1968-1981

ANNÉE	VENTES NATIONALES DE CIGARETTES TOUTES FAITES (EN MILLIERS)	VENTES NATIONALES[1] DE CIGARETTES ROULÉES À LA MAIN (EN MILLIERS)	VENTES NATIONALES DE CIGARETTES TOUTES FAITES ET ROULÉES À LA MAIN (EN MILLIERS)	VENTES NATIONALES DE CIGARES (EN MILLIONS)	CONSOMMATION ESTIMATIVE PAR HABITANT (CHEZ LES 15 ANS ET PLUS) DE CIGARETTES TOUTES FAITES ET ROULÉES À LA MAIN
1968	46,270,233	7,021,317	53,291,550	462	3,703
1969	46,582,210	6,817,494	53,399,704	509	3,619
1970	49,822,534	6,921,682	56,744,216	560	3,765
1971	50,864,422	7,188,643	58,053,065	624	3,772
1972	53,292,493	6,973,751	60,266,244	570	3,825
1973	54,864,304	7,358,724	62,223,028	609	3,849
1974	57,122,801	6,705,278	63,828,079	590	3,844
1975	57,755,795	6,709,747	64,465,542	474	3,799
1976	60,744,885	6,575,385	67,320,270	507	3,887
1977	61,786,571	6,315,140	68,101,711	466	3,901
1978	61,610,013	5,658,958	67,268,971	439	3,780
1979	63,865,638	5,226,595	69,092,233	420	3,816
1980	64,491,608	4,783,134	69,274,742	415	3,758
1981	66,558,869	4,763,915	71,322,784	414	3,872

Source: Statistique Canada, "Production et disposition des produits du tabac", (Catalogue nº 32-022), publication mensuelle, 1968-1981.

1. Selon Statistique Canada, on peut supposer que 1 kilogramme de tabac donne 1 000 cigarettes.

TABLEAU 48

CONSOMMATION QUOTIDIENNE ESTIMATIVE DE CIGARETTES PAR FUMEUR AU CANADA, 1965-1981

ANNÉE	NOMBRE ESTIMATIF[1] DE FUMEURS DE CIGARETTES (EN MILLIERS)	VENTES NATIONALES[2] DE CIGARETTES TOUTES FAITES ET ROULÉES À LA MAIN (EN MILIERS)	CONSOMMATION ESTIMATIVE PAR HABITANT CHEZ LES FUMEURS DE 15 ANS ET PLUS	CONSOMMATION QUOTIDIENNE ESTIMATIVE DE CIGARETTES PAR FUMEUR
1965	6,046.5	51,173,000	8,463	23.1
1970	6,471.7	56,744,216	8,768	24.0
1975	6,939.7	64,465,542	9,289	25.4
1977	6,906.0	68,101,711	9,861	27.0
1979	6,721.9	69,092,233	10,278	28.2
1981	6,668.2	71,322,784	10,695	29.3

Source: Statistique Canada, "Population 1921-1971, Révision des estimations annuelles de la population par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces" (Catalogue nº 91-512), Hors Série. Juillet 1973.

1. Santé et Bien-être social, Canada, "Usage du tabac au Canada, 1965-1979". Ottawa, 1980.

2. Statistique Canada, "Production et disposition des produits du tabac" (Catalogue nº 32-022), publication mensuelle, 1965-1981.

GRAPHIQUE 1

POURCENTAGE DE FUMEURS RÉGULIERS DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, SELON LE SEXE, CANADA, DE 1966 À 1981



GRAPHIQUE 2

POURCENTAGE DE FUMEURS RÉGULIERS DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, SELON L'ÂGE ET LE SEXE, CANADA, DE 1966 À 1981



GRAPHIQUE 3

PART DU MARCHÉ DES MARQUES CANADIENNES DE CIGARETTES À FAIBLE TENEUR EN GOUDRON[1], 1973 À 1981[2,3]



1. Marques à faible teneur en goudron: on désigne ainsi, de façon arbitraire, les marques de cigarettes dont les émissions nominales de goudron sont inférieures ou égales à 12 mg.

2. Graphique établi sur les données empruntées à William S. Richert et J.C. Robinson, "Yields of Selected Toxic Agents in the Smoke of Canadian Cigarettes, 1969 and 1978. A Decade of Change". Preventive Medicine, 10, 353-363, 1981.

3. Les données ayant trait aux années 1980 et 1981 ont été fournies par le Bureau de biométrie et de contrôle des produits du tabac, Laboratoire de lutte contre la maladie, Direction générale de la protection de la santé, Santé et Bien-être social Canada.

GRAPHIQUE 4

MOYENNE (PONDÉRÉE SELON LES VENTES) DES ÉMISSIONS DE GOUDRON, EN MILLIGRAMMES PAR CIGARETTE, DES MARQUES CANADIENNES, 1968-1981



MÉTHODOLOGIE

L'Enquête sur la population active du Canada est la plus vaste enquête permanente sur les ménages menée par Statistique Canada. Elle a maintenant lieu tous les mois et couvre la population civile hors institutions âgée de 15 ans et plus des dix provinces du Canada. En sont exclus les habitants du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, la population vivant dans les réserves indiennes et sur les terres de la Couronne, les détenus des institutions et les membres des Forces canadiennes. La population des régions exclues représente environ 2 % de la population totale du Canada.

L'échantillon aléatoire de logements est choisi au moyen de l'échantillonnage à plusieurs degrés. Quelque 56 000 logements sont ainsi échantillonnés chaque mois. Les ménages qui habitent les logements choisis aux fins de l'enquête sont interviewés une fois par mois pendant six mois consécutifs. Les ménages participants sont répartis en six cohortes. Chaque mois une nouvelle cohorte est intégrée à l'échantillon par voie de renouvellement et, une fois parvenu à son sixième mois, elle est remplacée par une autre.

Le plan de l'Enquête sur la population active comporte des facteurs de pondération compliqués. Les provinces font l'objet de fractions de sondage différentes afin d'assurer la stabilité des estimations à l'échelle provinciale. Un deuxième facteur de pondération tient compte de la non-réponse, tandis que deux autres prévoient les ajustements à faire compte tenu de la structure urbaine/rurale, ainsi que de la distribution de la population par âge et par sexe. Pour établir ces deux derniers facteurs, on compare les proportions de l'échantillon avec les estimations de la population afin de compenser le glissement démographique. Par glissement il faut entendre les mouvements de population qui se sont produits depuis la création du plan de sondage de base.

L'Enquête sur la population active vise essentiellement à mesurer l'activité et les caractéristiques de la main-d'oeuvre. Cependant, depuis 1965, le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social suit l'évolution du tabagisme chez les Canadiens au moyen de suppléments à l'Enquête sur la population active. L'enquête de 1981 sur les habitudes de fumer se fonde sur l'utilisation d'un échantillon d'un tiers des ménages (deux renouvellements) faisant partie de l'Enquête sur la population active.

Les données fournies par les enquêtes par sondage sont sujettes à des erreurs provenant d'un certain nombre de sources. On distingue deux types fondamentaux d'erreurs: les erreurs d'échantillonnage et les erreurs non imputables à l'échantillonnage. Dans le premier cas, l'erreur surgit du fait que l'échantillon ne prend pas en compte chaque unité de la population, ce qui donne lieu à un certain degré d'incertitude quant aux estimations faites à partir de l'échantillon. On peut évaluer l'importance de cette erreur qui dépend grandement de la taille de l'échantillon sur lequel se fonde l'estimation ainsi que la variabilité de chaque caractéristique considérée.

Dans l'Enquête sur la population active, des évaluations de la fiabilité des données, connues sous le terme d'erreur d'échantillonnage ou coefficient de variation, servent à déterminer la transmission des statistiques. Ces évaluations s'expriment sous forme de pourcentage du nombre auquel elles se rapportent, et elles sont habituellement plus élevées pour les petits sous-groupes de la population (par exemple les régions urbaines et rurales de moindre importance). Dans le présent rapport, les nombres dont l'erreur d'échantillonnage se situe entre 16,6 % et 25 % sont marquées d'un "Q". Il convient donc d'interpréter ces données en se rappelant qu'elles sont sujettes à une forte erreur d'échantillonnage. Quant aux estimations dont l'erreur d'échantillonnage est supérieur à 25 %, elles ne figurent pas dans l'Enquête sur la population active. Elles sont remplacées par un astérisque (*).

Les erreurs non imputables à l'échantillonnage visent tous les autres types d'erreur. Elles peuvent provenir de sources variées come la couverture, la mesure, la non-réponse, les réponses des enquêtés-substituts, la dépouillement et l'estimation.

Un certain nombre de modifications ont été apportées à l'enquête de 1981 sur les habitudes de fumer. Des questions supplémentaires visaient à définir plus nettement les groupes à risque élevé, et à discerner les groupes chez qui la tendance vers une réduction de la consommation tabagique ou vers la cessation de l'usage du tabac est plus manifeste. Ces questions d'appoint permettent d'évaluer la durée de l'habitude, l'âge où se prend cette habitude, et les efforts en vue de réduire le taux de consommation ou de renoncer au tabac.

Comme l'enquête sur les habitudes de fumer fait intervenir des enquêtés-substituts, on a jugé bon d'introduire des contrôles pour l'ensemble des questions nouvelles. Là où un enquêté-substitut n'était pas trop certain de la réponse à donner au nom d'une personne faisant partie d'un ménage, l'interviewer avait pour consigne de faire le nécessaire pour parler à la personne en question par téléphone ou de passer chez elle un peu plus tard au moment où il serait possible d'obtenir le renseignement voulu. Mais le fait d'introduire des contrôles à l'égard des réponses relayées par des tiers ne compense pas pour les résidents-substituts qui fournissent des renseignements inexacts sur les habitudes tabagiques des autres membres du ménage. Il est possible que les réponses relayées par des tiers tendent à créer un biais à la baisse dans les estimations relatives à la prévalence de l'usage du tabac, notamment pour ce qui est du groupe des 15-19 ans. Les répondants peuvent ne pas être au courant du comportement tabagique des adolescents qui font partie du ménage.

Les chiffres estimatifs de la population de base à partir de laquelle on a évalué le niveau de consommation tabagique sont présentés afin de faciliter la tâche au lecteur qui désire combiner les différents groupes d'âge.

ANNEXE B

DÉRIVATION DE LA VARIABLE "EFFORT MANIFESTE POUR RÉDUIRE LE TAUX DE CONSOMMATION TABAGIQUE"

QUESTION		RÉPONSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Question 21	S'agit-il de la même sorte de cigarette (marque, format, filtre, bout uni) qu'il(elle) ... fumait il y a 12 mois?	=1 même marque =2 marque différente =3 ne fumait pas il y a 12 mois	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Question 22	Est-ce que la marque... qu'il(elle) fume maintenant est plus forte, plus douce ou à peu près la même que celle...qu'il(elle) fumait il y a 12 mois?	=1 plus forte qu'il y a 12 mois =2 plus douce qu'il y a 12 mois =3 à peu près la même qu'il y a 12 mois					Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Question 23	Par rapport à il y a 12 mois ...fume-t-il(elle) maintenant plus, moins ou à peu près autant?	=1 fume plus =2 fume moins =3 fume à peu près autant		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Variable dérivée	= effort manifeste			X						X	X		X	
		= aucun effort		X		X	X	X	X	X			X		X
		= fin	X												

Statistique Canada — **ENQUÊTE SUR LES HABITUDES DE FUMER 1981** — DOCUMENT CONFIDENTIEL une fois rempli

N° de dossier 2 — Date d'enquête 3 (Mois / Jour) — N° d'attribution 4 — 1 FORMULE 06

5 — 6 Prénom — 7 Nom de famille

) . . . A-T-IL (ELLE) DÉJÀ FUMÉ LA CIGARETTE, LE CIGARE OU LA PIPE?

Oui 1 ○ Non 2 ○ *Passez à 30*

1 À L'HEURE ACTUELLE, . . . FUME-T-IL (ELLE) LA PIPE?

Oui 1 ○ Non 2 ○ *Passez à 13*

2 À L'HEURE ACTUELLE, . . . FUME-T-IL (ELLE) LA PIPE RÉGULIÈREMENT (HABITUELLEMENT TOUS LES JOURS) OU SEULEMENT À L'OCCASION (PAS TOUS LES JOURS)?

Régulièrement 1 ○ À l'occasion 2 ○

3 À L'HEURE ACTUELLE, . . . FUME-T-IL(ELLE) LE CIGARE?

Oui 1 ○ Non 2 ○ *Passez à 15*

14 À L'HEURE ACTUELLE . . . FUME-T-IL (ELLE) LE CIGARE RÉGULIÈREMENT, (HABITUELLEMENT TOUS LES JOURS) OU SEULEMENT À L'OCCASION (PAS TOUS LES JOURS)?

Régulièrement 1 ○ À l'occasion 2 ○

15 À L'HEURE ACTUELLE, . . . FUME-T-IL (ELLE) LA CIGARETTE?

Oui 1 ○ Non 2 ○ *Passez à 26*

16 À L'HEURE ACTUELLE . . . FUME-T-IL (ELLE) LA CIGARETTE RÉGULIÈREMENT, (HABITUELLEMENT TOUS LES JOURS) OU SEULEMENT À L'OCCASION (PAS TOUS LES JOURS)?

Régulièrement 1 ○ À l'occasion 2 ○

17 À QUEL ÂGE . . . A-T-IL (ELLE) COMMENCÉ À FUMER?

Inscrivez l'âge

18 COMBIEN DE CIGARETTES . . . FUME-T-IL (ELLE) PAR JOUR?

Inscrivez le nombre

19 HABITUELLEMENT, . . . ASPIRE-T-IL (ELLE) LA FUMÉE?

Oui 1 ○ Non 2 ○ Ne sait pas 9 ○

20 QUELLE SORTE DE CIGARETTES . . . FUME-T-IL (ELLE) HABITUELLEMENT? (MARQUE, FORMAT, BOUT FILTRE, BOUT UNI)

Inscrivez le code

21 EST-CE LA MÊME SORTE DE CIGARETTES QUE . . . FUMAIT IL Y A DOUZE MOIS? (MARQUE, FORMAT, BOUT FILTRE, BOUT UNI)

Oui 1 ○ *Passez à 22* Non 3 ○

Ne fumait pas il y a douze mois . . . . . 3 ○ *Passez à 24*

22 LA SORTE DE CIGARETTES QUE . . . FUME MAINTENANT EST-ELLE PLUS FORTE, PLUS DOUCE OU SEMBLABLE À CELLE QUE . . . FUMAIT IL Y A DOUZE MOIS?

Plus forte . . . . . 1 ○

Plus douce . . . . . 2 ○

Semblable . . . . . 3 ○

23 PAR RAPPORT AUX DOUZE DERNIERS MOIS, . . . FUME-T-IL (ELLE) MAINTENANT DAVANTAGE, FUME-T-IL (ELLE) MOINS, OU FUME-T-IL (ELLE) ENVIRON LA MÊME QUANTITÉ DE CIGARETTES? indiquez un seul cercle

Fume davantage . . . . . 1 ○

Fume moins . . . . . 2 ○

Fume environ la même quantité . . . . . 3 ○

24 . . . A-T-IL (ELLE) FAIT UN EFFORT POUR CESSER DE FUMER AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS?

Oui 1 ○ *Passez à 30* Non 2 ○ *Passez à 30*

25 . . . A-T-IL (ELLE) DÉJÀ FUMÉ LA CIGARETTE RÉGULIÈREMENT?

Oui 1 ○ Non 3 ○ *Passez à 30*

26 À QUEL ÂGE . . . A-T-IL (ELLE) COMMENCÉ À FUMER LA CIGARETTE RÉGULIÈREMENT?

Inscrivez l'âge

27 DEPUIS COMBIEN DE TEMPS . . . A-T-IL (ELLE) CESSÉ DE FUMER LA CIGARETTE RÉGULIÈREMENT?

Moins d'un an . . . . . 00 ○

ou

Inscrivez le nombre d'années

28 COMBIEN DE CIGARETTES . . . AVAIT-IL (ELLE) L'HABITUDE DE FUMER PAR JOUR?

Inscrivez le nombre

29 . . . AVAIT-IL (ELLE) L'HABITUDE D'ASPIRER LA FUMÉE?

Oui 1 ○ Non 2 ○ Ne sait pas 9 ○

30 SOURCE DE RENSEIGNEMENTS

N° de page-ligne du DM

99 NOTES — Servez-vous du verso pour NOTES supplémentaires ○

8-6400-9: 28-9-81 TSS 102906

SEE REVERSE FOR ENGLISH

Déclaration exigée en vertu de la Loi sur la statistique, chapitre 18, Statuts du Canada de 1970 - 71 - 72